



鼻炎治療劑 衛署藥製字第 026867 號

## 保 普 健 膠 囊

### Paputin Capsules

鼻炎一般可分為急性鼻炎及慢性鼻炎，在急性鼻炎及所謂感冒，其次流鼻水，鼻塞為主要症狀，亦常併發打噴嚏、嗅覺異常、頭痛、微發熱、鼻聲等，但若能施以早期治療則容易痊癒，否則易變為慢性鼻炎，較難治療而引起患者身心困擾，本劑針對於此採用副作用少、藥性確實之主成分合理配合而成，能消除鼻炎之症狀。

#### 【成 份】

每膠囊含：

主成分：

1. Pseudoephedrine HCl-----60mg
2. Carbinoxamine Maleate-----4mg
3. Lysozyme Chloride-----12.5mg
4. Glycyrrhizinic Acid-----15mg
5. Caffeine Anhydrous-----40mg

賦形劑：

6. Silici Acid Light
7. Corn Starch
8. Magnesium Stearate
9. Lactose
10. 2 號紅白色膠囊殼  
(Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Purified Water、New Coccin、Titanium Dioxide、Sunset Yellow FCF)

#### 【特 徵】

1. 本劑為耳鼻喉科鼻炎用劑，對鼻炎所發生之一切症狀可迅速有效的消除而恢復健康。
2. Pseudoephedrine HCl 為具有緩解鼻黏膜充血、腫脹作用，可以減輕鼻塞、流鼻水現象。
3. Carbinoxamine Maleate 對感冒等上氣管炎所伴之咳嗽、鼻閉、鼻塞、流鼻涕有優於 Bena 及 Chlorpheniramine maleate 之作用，且吸收、排泄更迅速、副作用更少。
4. Lysozyme chloride 為黏多糖分解酵素，能使以黏多糖為主體的膿性鼻涕及痰分解液化。
5. 本劑更配合有抗炎作用之 Glycyrrhizinic Acid 及 Caffeine Anhydrous 可促進本劑主成分間產品相乘效果之作用。

#### 【適 應 症】

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀（鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢）。

#### 【用法、用量】

成人每次 1 粒，每天 3 次，每次間隔 4 小時以上服用。醫師藥師藥劑生指示藥品。

#### 【注 意 事 項】

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

五、本藥含 Pseudoephedrine HCl，應注意下列事項：

(一)、除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病、高血壓、甲狀腺疾病、糖尿病、前列腺腫大引起之排尿困難者不得服用。

(二)、服用 Monoamine oxidase inhibitor (MAOI)期間，或停用 MAOI 兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用之藥物是否含有 MAOI，請詢問醫師或藥師。

六、本藥含有咖啡因類成分，應限制再服用含咖啡因藥品、飲料(如茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張、興奮與失眠、且常會引起心搏過速。

#### 【警 語】

一、服用次藥後，可能引起倦怠感、口乾、偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應（以幼兒及老年人常見）。

二、除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。

三、除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得服用。

四、除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心機能障礙、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎機能障礙症狀者不得服用。

五、老年人應小心使用本藥，3 歲以下不建議使用。

六、如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難患者，請勿使用。

七、服用本藥不得與酒精類飲料合用。

八、除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併服鎮靜劑或安眠劑等。

九、服用本藥後可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。

十、連續服用本藥數日後，如果症狀沒有改善，應立即就醫。

十一、不得與其他含有抗組織胺成分或鼻充血解除成分之內服製劑共用（如綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥物或抗過敏藥等）

#### 【包 裝】

6~21 粒鋁箔盒裝

永吉製藥股份有限公司

屏東縣萬丹鄉萬丹路三段 91 號

電 話：(08)7772291