

“晟德” 樂黴素膠囊

Leucomycin Capsules

250毫克

250mg "CENTER"

衛署藥製字第 027221 號

主 成 份：每膠囊含有

Leucomycin 250mg (力價)

適 應 痘：

革蘭氏陽性、陰性菌、立克次氏體及巨型濾過性病毒感染症。

用法用量：本藥須由醫師處方使用

通常成人1次1-2粒，每6-8小時服用一次，並可視症狀適當的酌予增量。

抗生素樂黴素 leucomycin 是日本北里研究所秦藤樹博士等於新種之放線菌 Streptomyces Kitasatoensis Hata，分離出之 Macrolide 系白色結晶性抗生物質，是一種廣領域抗生素 (Broad Spectrum Antibiotics) 對於革蘭氏陽性菌的一部份、革蘭氏陰性菌、立克次氏體、大型濾過性病毒等有強力的抗菌作用，尤其對於最近在治療上發生問題之青黴素、鏈黴素、四環黴素等抗生素有耐性之細菌感染症有很好之治療效果，本劑係以 Leucomycin 為主，依抗菌性物質標準製造之製劑。

特 長：

1. Leucomycin 是 Macrolide 系廣領域抗生素。
2. 對於一般之感染菌，尤其是葡萄球菌、連鎖球菌、肺炎雙球菌、革蘭氏陽性菌有強力之抗菌作用。
3. 本製劑性質安定，毒性低，口服後即能快速達到有效之血中濃度。
4. 腸內細菌大部分為革蘭氏陰性菌，服用本劑不致因腸內革蘭氏陰性菌之減少而下痢及腸內異常發酵乃至維生素障礙二次副作用之現象。
5. 對於青黴素、鏈黴素、四環黴素等有耐性之細菌，本劑亦有抗菌作用，特別對於耐性葡萄球菌感染症，本劑有特別好之治療效果。

注意事項：

1. 禁忌：曾經對本劑產生過敏現象的患者。

2. 副作用：

- (1) 胃腸：偶而會有食慾不振，噁心，嘔吐，軟便，下痢等症狀發生。
- (2) 肝臟：連續使用時，很少會有肝障礙發生，但也要詳細的觀察，如發現有異常現象，就必須中止服用。
- (3) 過敏症：發疹，蕁麻疹等過敏現象發生時，中止服用。

賦 形 劑：Corn Starch, Tween 20, Magnesium Stearate, Calcium CMC.

包 裝：8-1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝

儲 存：室溫保存。

委 託 者：晟德大藥廠股份有限公司(公司)

CENTER LABORATORIES INC.

地 址：臺北市南港區園區街3之2號7樓

公司電話：(02)2655-8680 圖文傳真：(02)2655-8380

製 造 廠：台裕化學製藥廠股份有限公司

廠 址：新竹縣竹東鎮員山路11巷13弄1號

CTRA-003 20150603

14L02-D01