【仿單】 W 95 mm × H 185 mm

"華琳"阿定錠 2 毫克

Artine Tablets 2mg "H.L."

本藥須由醫師處方使用　　衛署藥製字第 027374 號

【成　　分】每錠中含有：

Trihexyphenidyl HCl (Benzhexol HCl) ..... 2.0 mg

賦形劑：Lactose、Potato Starch、Food Color Yellow No.4、Magnesium Stearate。

【適 應 症】特發性帕金森氏症及其它帕金森氏症(腦炎後、動脈硬化症)。

【用法用量】初劑量第一天 1 ~ 2mg，以後 3 ~ 5 天內，每天增加 2mg，直到最佳效果出現，一般維持劑量每次 2 ~ 4mg，每天三次；一般劑量範圍爲每天 1 ~ 15mg。

【注意事項】1.本品對心臟、肝臟、腎臟障礙患者或患有高血壓者並無禁忌，惟對患高血壓者，應妥善看護。

2.因有些病人須持續服用本品，又因本劑有似 atropine 的性質，需不斷的長期觀察，以免產生過敏性，及其他不良反應。

3.本劑因具副交感神精解除作用(Parasympatho lytic activity)所以使用於青光眼、胃腸障礙及生殖泌尿道障礙及可能有前列腺腫大的男性病人，應小心使用。

4.對 60 歲以上老年人常會對本品發展成敏感性增加，因此需嚴格調整劑量。

5.服用本品的患者，需測定視軸角度(Gonioscope Evalution)，且需定期間歇測定眼內壓。

【儲藏條件】請儲存於緊密容器、陰涼、避光處所。

【包　　裝】1 ~ 1000 錠塑膠瓶裝。

LT-T171

【委託者】
華琳實業有限公司
基隆市安樂區樂利三街 309 號

【製造廠】
福元化學製藥股份有限公司
新北市瑞芳區大寮路 95-1 號