

"世達" 利普樂膠囊 10 公絲

(滌 比 得)

Lipolar Capsules 10 mg "S.T."
(Bromopride)

衛署藥製字第 27457 號

【簡 介】

本劑係一最新研究成功的胃腸道機能異常改善劑，對凡上腹部消化道引起的噁心、嘔吐、脹滿、痙攣痛等症狀，均能發揮其特殊的治癒效果，其對噁心、嘔吐之效能比 Metoclopramide，Chlorpromazine 更佳，而且更具有治療消化潰瘍之獨特作用。

【成 分】

Each Capsule Contains : Bromopride.....10 mg

【賦 型 劑】

Lactose、Crystalline Cellulose、Lactose PG 40#。

【膠囊殼】

Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、Titanium Dioxide、Tartrazine。

【特 長】

- 1.Anti-emetic : 有強力止吐作用。
- 2.Anti-ulcerous : 對 Serotonin 及 Polymyxin B 所致實驗性消化潰瘍有癒合作用。
- 3.Spasmyolytic : 對 Histamin Acetylcholine 或 Barium Chloride 引起的上腹部及結腸痙攣有緩解作用。
- 4.Eukinetic : 促進胃內容物之排空以解除胃部食物停滯，且對胃腸道之運動異常有抑制及調節作用。
- 5.Local Anesthetic : 有類似 Oxethazaine 之作用。高劑量對 CNS 才有鎮靜作用。

【適 應 痘】

嘔吐、噁心、脹氣性消化不良、胃酸過多、上腹部痛、痙攣性結腸疾患、胃・十二指腸潰瘍、胃・十二指腸炎、裂孔赫尼亞、出血性直腸、結腸炎、消化管之 X 線檢查。

【用法用量】

通常成人一天 3 次，一次一粒，宜依年齡，症狀增減之，本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- 1.禁忌：兩歲以下嬰兒、孕婦，以及服用鎮靜劑期間者除非有特別指定，否則不可使用。對有痙攣症的患者尤需更加小心。
- 2.副作用：服用本藥品短時間內可能產生痙攣現象，在停止使用後短時間內可好轉。若併用抗帕金森氏症製劑可立即消除。
- 3.交互作用：為了防止因交互作用引起對身體可能的影響，應避免與精神作用藥品(如鎮靜劑、抗抑鬱劑、抗焦慮劑鋰鹽)安眠藥或酒精併用。其它種類的藥品也儘可能與使用本藥品之時間相互錯開。乃因胃腸道活動力之改變會影響一齊併用藥品的吸收。本藥品可加速與提高對 Aspirin, Paracetamol, Quinidine, Diazepam, Lithium 以及抗生素的吸收，然而對 Digoxin 之吸收則相對減少。
Atropine 與其它抗膽礎素藥品(Anticholinergic drugs)可能減低本藥品對胃腸蠕動之功能。

【包裝】

6~1000 粒瓶裝。



世達藥品工業股份有限公司
台中市工業區 15 路 2 號