

“優良”優可黴素膠囊 250 毫克 (西華克樂)

U-CLOR CAPSULES 250 mg (Cefaclor)

衛署藥製字第 027513 號

“優良”優可黴素膠囊 500 毫克

U-CLOR CAPSULES 500mg (Cefaclor)

衛署藥製字第 027514 號

“優良”優可黴素膠囊 U-Clor Capsules 的主成分 Cefaclor 是一種口服半合成 Cephalosporin 類抗生素。化學式為 3-Chloro-7-D-(2-phenylglycinamido)-3-cephem-4-carboxylic Acid.

【藥理】

“優良”優可黴素在空腹狀態下，口服吸收良好，不論飯前或飯後服用，其總吸收量都相同。空腹時，服用 250mg, 500mg, 1Gm 的劑量，30~60 分鐘內可測得平均最高血中濃度，分別為 7, 13 或 23 $\mu\text{g}/\text{mL}$ ，八小時內，有 60~85% 的藥物從尿中以原形式排出。但大部份是在頭二小時內排出的，其最高尿中濃度各為 600, 900, 1900 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 。正常情形之下，在血中半衰期為 0.6~0.9 小時，但對於腎功能不健全的患者，其半衰期稍長些。至於那些腎功能完全喪失的患者，半衰期則長達 2.3~2.8 小時。

【成分】

每膠囊內含 Cefaclor (as Monohydrate) 250mg 及 500mg (力價)。

【作用】

實驗顯示，Cephalosporin 類抗生素的抗菌作用在於抑制細菌細胞壁的合成。實驗和臨床上，“優良”優可黴素膠囊對以下各種感受性細菌所引起的中耳炎，上呼吸道，下呼吸道，泌尿生殖道，以及皮膚和軟組織的感染有很好的療效：

葡萄球菌(Staphylococci)，包括凝固酶陽性(Coagulase-positive)凝固酶陰性(Coagulase-negative)
化膿性鏈球菌(Streptococcus pyogenes) (乙種溶血性鏈球菌 A 族(Group A beta-Hemolytic Streptococcus))
肺炎鏈球菌(Streptococcus pneumoniae)
大腸桿菌(E. coli)
奇異變形菌 (Proteus mirabilis)
克雷白氏菌屬(Klebsiella species)
流行性感嗜血桿菌(Haemophilis influenzae)，包括對 Ampicillin 有抗藥性的菌株。

【適應症】

葡萄球菌，甲、乙種溶血性鏈球菌，肺炎雙球菌，大腸桿菌，奇異變形菌，克雷白氏菌屬，嗜血桿菌等病原菌所引起的感染症。

【用法用量】

成人—一般劑量為每八小時 250mg，嚴重感染，劑量可加倍，但每日最高劑量以 4Gm 為限，連續服用 28 天仍很安全。

兒童—建議劑量為每日每公斤體重 20mg，分三次服用。嚴重感染劑量可加倍，但每日最多以 1Gm 為限。感染乙種溶血性鏈球菌的患者，服用本劑，至少要連續服用十天。
本藥須由醫師處方使用。

【禁忌】

已知對 Cephalosporin 類抗生素過敏的患者，對本劑也會有過敏反應。

【警語】

對青黴素過敏的患者，使用本劑須特別小心。因臨床和實驗顯示，青黴素和頭芽孢菌屬抗生素可能有部份交互過敏反應現象。

【副作用】

- 1.腸胃道: 偶會有噁心、嘔吐、腹瀉現象。與其它廣效性抗生素合用, 曾有罕見的假膜性結腸炎發生。
- 2.過敏: 有些患者會有藥疹、搔癢、陽性 **Coombs test**、多形紅斑, 關節痛, 發燒等反應, 而這些反應在停藥後會漸漸消失。對青黴素過敏的患者, 對本劑亦會有過敏反應。
3. 偶會有嗜伊紅血球增多、生殖器搔癢、陰道炎等現象發生。曾有 **SGOT**、**SGPT** 稍稍提高的情形。

【注意事項】

- 1.服用本劑, 若有過敏反應, 則須停藥, 若有必要可以加壓胺、抗組織胺、腎上腺皮質素處理。
- 2.長期服用本劑, 可能引起體內非感受性細菌的過度生長, 服用期間要詳加觀察。
- 3.治療期間, 若發生再感染, 則須採取適當措施。
- 4.分娩前服用 **Cephalosporin** 類抗生素的患者, 其新生兒在 **Coombs test** 中呈陽性反應。
- 5.腎功能不健全的患者, 必須慎用本劑, 其服用劑量通常較低些。
- 6.服用本劑, 尿糖可能有假陽性反應。
- 7.孕婦及新生兒使用本劑的安全性尚未確定。

【賦形劑】

“優良”優可黴素膠囊 250 毫克(西華克樂):

Lactose、Glyceryl behenate、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Aerosil silicone dioxide
Capsule (Gelatin, Glycerol, Sodium Lauryl Sulfate, Erythrosine, Brilliant Blue FCF, Titanium Dioxide)

“優良”優可黴素膠囊 500 毫克:

Polydimethyl siloxane、Colloid silicon dioxide、Stearic acid、Sodium starch glycolate
Capsule (Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate, Titanium Dioxide, Brilliant Blue FCF, New Coccin, Tartrazine)

【包裝】

“優良”優可黴素膠囊 250 毫克(西華克樂): 6~1000 粒瓶裝、鋁箔盒裝

“優良”優可黴素膠囊 500 毫克: 6~1000 粒塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝

委託者: 優良化學製藥股份有限公司

地址: 新竹縣湖口鄉中興村光復路 10 號

製造廠: 瑞士藥廠股份有限公司新市廠

地址: 台南市新市區中山路 182 號