高尿酸血症改善劑

"世達" 適 莫 痛 錠 50 公絲

(本麻隆)

Zimaron Tablets 50 mg "S.T."

(Benzbromarone)

衛署藥製字第 027568 號 (GMP G-0061 號)

痛風 (Gout) 有別於風濕熱或類風濕性關節炎，它起因於嘌呤新陳代謝的障礙，使人體內尿酸 (Uric Acid) 含量過多，生成痛風石而沉積在關節附近所引起之脹痛症狀。若不加以防範或適當治療，便會演進為高尿酸血症，甚至更成為急性關節炎或慢性關節炎。本劑可促進尿酸的排泄及抑制尿酸的形成，故降低血中尿酸值，緩解痛風患者症狀。

【成 分】

每錠中含：Benzbromarone……..……50 mg

【賦 型 劑】

Dibasic Calcium Phosphate hydrate、Lactose、Corn Starch、Colloid Silicon Dioxide、Hydroxypropyl cellulose、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Talc。

【適 應 症】

痛風、高尿酸血症。

【用法用量】

通常成人一次一錠，一天 2~3 次，宜依年齡、症狀酌減之。

本藥須由醫師處方使用。

【警語及注意事項】

1.急性痛風發作時勿給藥，俟平靜後投與。

2.投藥初期：由於尿酸之移動使痛風之發作有暫時性之增強，故治療初期約一週左右，投藥量一天一錠。

3.為防範尿酸結石，應注意多喝開水，增多尿量以提高尿之鹼度，以免發生血尿、腎疝痛之症狀。

4.長期投與應作肝功能檢查。

5.開始投與本藥品前，應先進行肝功能檢查，以確認病人沒有肝功能異常。

6.腎功能異常之患者，建議酌予減量。

7.重度肝功能異常之患者，應小心使用。

8.猛爆性肝炎等嚴重肝臟不良反應，主要會在開始投藥前六個月內發生，因此最少在最初給藥六個月內，應定期進行肝功能檢查。

9.在使用期間如有肝臟不良反應之症狀如：食慾不振、全身倦怠發生時，應立即停止使用本藥品，並到醫療院所就醫檢查。

10.在使用本藥前須檢查肝功能，以確認有無肝臟疾病。並應告知病人使用本藥可能有肝臟疾病的副作用，如出現食慾不振、噁心嘔吐、疲倦虛弱、腹痛、下痢、發燒、深色尿液、結膜變黃等症狀，應停藥並立即就醫。

禁忌症：①對本藥過敏者。②嚴重肝功能不良。③嚴重腎功能不良。④尿酸性腎臟結石⑤懷孕及可能懷孕的婦女。

副作用：①過敏症：蕁麻疹、發疹、顏面發紅、紅斑、搔癢感。②肝臟：S-GOT、S-GPT、Alkali-phosphatase 值均上升。③胃腸道：偶有胃痛、腹痛、胃部不快感、胸悶、噁心、下痢、軟便。④其他：偶有浮腫、心窩部不快。

孕婦投與：動物實驗，有催畸形作用，孕婦及可能懷孕婦人儘量避免使用。

【儲存條件】

25℃以下，並儲存於緊密容器內。

【包 裝】

4 ~ l000 粒塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

本品 Code No.：T-044

世達藥品工業股份有限公司

台中市工業區 15 路 2 號