

“景德” 息 弗 欣 注射劑/750 公絲
(希福辛)
CEFOXIN Injection 750mg “Kingdom”
(Cefuroxime)

特性：

本品之主成分 Cefuroxime(Sodium 形式) 是一種廣效性之 Cephalosporin 抗生素，對大多數β-Lactamases，革蘭氏陽性、陰性菌及敏感性細菌所致之感染有效。如：呼吸道感染症：急性慢性支氣管炎，感染性支氣管擴張症，細菌性肺炎，肺膿腫症及手術後胸腔感染症。

耳、鼻、喉感染症：鼻竇炎、扁桃腺炎、咽喉炎。

尿道感染症：急性慢性腎盂腎炎，膀胱炎及無症狀之菌尿症。

軟組織感染症：蜂窩織炎，丹毒，腹膜炎及創傷感染。

骨及關節感染症：骨髓炎及敗血性關節炎。

產科及婦科感染症：骨盆腔炎症性疾病。

淋病：由以 penicillin 不適用時。

其他感染症：敗血病及腦膜炎。

成分：

每小瓶中含 Cefuroxime Sodium 相當於 Cefuroxime 750mg(力價)。

適應症：

由葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

用法用量：

成人：

一般感染症，一日三次，每次 750mg，較嚴重之感染可增加至每六小時注射 1.5gm。

孩童：

一日 30~100mg/kg，分 3~4 次使用。

肌肉內注射：

配置本品為注射液時，可加注射用水 3ml，輕輕振搖之，使成不透明之懸浮液。

靜脈內注射：

溶解本品供靜脈內注射時，至少須加注射用水 6ml。

本藥限由醫師使用。

注意事項：

1. 對 Cephalosporin 系抗生素過敏者，禁用本品。
2. 使用本品偶有發疹、胃腸障礙，念珠菌性濕疹，血色素濃度降低及嗜伊紅血球增多之現象，但僅是暫時性的。
3. 對 Penicillin 有反應者，使用本品較為安全，但仍宜謹慎用之。
4. 接受利尿劑(如 furosemide)治療之患者，若同時併用高劑量之本品，會影響腎功能，應避免之。
5. 對於妊娠初期之孕婦，宜小心使用本品。
6. 本品行肌肉注射可能有暫時性的疼痛，使用高劑量時此種疼痛更易出現。
7. 本品應儲存於 25°C 以下，並避光之。

賦形劑：

無

包裝：

1 小瓶裝

衛署藥製字第 027973 號
G-0125

景德製藥股份有限公司

公司地址：台北市中山北路二段 113 號 8 樓

製造廠址：新北市土城區中央路二段 104 號