

克痢淨懸浮液

KAOTIN Suspension

(Kaolin mixture with Pectin N. F.)

【劑型、成分】

懸浮液劑：每 100 ml 含

Kaolin (20 Gm)

Pectin (1 Gm)

克痢淨 懸浮液係以膠質高嶺土為主要原料，根據最新美國國民藥局方精製而成，專用於治療各種腹瀉、慢性腸炎、食物中毒等所引起之腹瀉及慢性之潰瘍性結腸炎。

克痢淨 懸浮液所含之膠質高嶺土具有高度吸著能力，可吸著細菌及其所產生毒素及不潔食物中之毒質，故有解毒、止瀉之功效；又因其具有保護黏膜之作用，可使腸胃黏膜免受刺激而使之迅速痊癒。

因高嶺土之作用純為吸著解毒及保護，除在腸胃道中作用外，不進入任何器官組織，且本品不含任何烈性藥品，故無副作用，無論男女老幼均宜服用。

克痢淨 懸浮液亦可與特效治療藥物（如抗生素、磺胺藥物）配方，以增強其藥品之功效。

【適應症】

暫時緩解輕微或中度急性腹瀉。

【用法用量】

每天服用四次、每次 8~15 歲 15 ml、4~7 歲 7 ml、3 歲以下 3 ml、成人每次服用 20 ml。附 30 ml (c.c.) 量器壹個。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【副作用】

可能引起便祕。

【注意事項】

- 須置於小孩接觸不到之處。
- 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
- 液劑使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。

【警語】

- 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，對於牛奶或乳製品過敏者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過 5 gm。
- 腹瀉最重要的治療是水份與電解質的補充，止瀉劑只能做為輔助性治療。
- 不嚴重的腹瀉，不吃藥也可能自行痊癒。
- 除非藥師、藥劑生或醫師指示，急性腹瀉使用止瀉劑不得超過 48 小時。
- 除非藥師、藥劑生或醫師指示，6 歲以下小孩、或有發燒及全身症狀者、最近使用過抗生素者、有潰瘍性結腸炎或類似疾患者不得自行使用止瀉劑。

【包裝】

120 ~ 4000 公撮瓶裝。

衛署藥製字第 028020 號

景德製藥股份有限公司

廠址：台北縣土城市中央路二段 104 號