

中國化學

蘇克胃錠 500 公絲(斯克拉非)

Sucway Tablets 500mg

Sucralfate

網號：D39

本劑口服時，主成分 Sucralfate 會變為帶有多個陰離子且具高度黏著性的物質，而一般潰瘍區黏膜由於細胞質滲出物及細胞碎片的堆積，造成有豐富蛋白質的區域，這些蛋白質使潰瘍區帶正電，故當投入本劑時帶多個陰離子負電的 Sucralfate 即與潰瘍區正電形成多價鍵結，而能選擇性地吸附在破損的黏膜上並形成一層具有黏著性的保護膜包於潰瘍處，發揮如下三方面的功能並可增強細胞保護障壁：

1. 阻止胃酸及胃蛋白酶擴散至潰瘍黏膜區。(抗擴散的障壁)。
2. 與細胞表面的蛋白質形成抗胃蛋白酶的複合物，以保護新形成的黏膜細胞不被胃蛋白酶分解。(抗胃蛋白酶分解的障壁)。
3. 保護新形成的黏膜細胞不被膽汁、酒精、阿斯匹林及其他消炎藥所瓦解。(抗瓦解的障壁)。

成分：每錠含有：

Basic Aluminum Sucrose Sulfate
(Sucralfate).....500mg

適應症：胃潰瘍、十二指腸潰瘍。

用法：本藥須由醫師處方使用。

每天四次，於早、午、晚餐前一小時及夜晚睡覺前各服一次，每次二錠。

注意事項：

1. 配合禁忌：截至目前尚無報告指出有禁忌。
2. 注意：十二指腸潰瘍是慢性定期發生的疾病。短期以本品治療能完全治好潰瘍，但對於治療後的經常性或嚴重性十二指腸潰瘍並不能得到成功的期望。

3. 藥物相互作用：動物研究顯示同時服用 Tetracycline, Phenytoin 或 Cimetidine 會減少本品的生體可用率。而這種作用並不是系統性，或許是在胃腸道與本品結合。這些藥物的生體可用率在分開投與後兩小時恢復原狀。

4. 懷孕：在高達人類劑量的 50 倍才會對老鼠、兔子產生畸形胎而沒有對胎兒有害的證據，然而沒有足夠與控制良好的對懷孕婦女研究。因為動物的生殖研究並不完全與人類有共同預期結果，所以只有在有明顯需要才用於懷孕期間。

5. 副作用：對於 2500 名病患服用本藥研究報告顯示，只有 121 名病患(4.7%)有副作用產生。便秘是最常有的約 2.2%，其他副作用下痢、噁心、胃腸不適、消化不良、口乾、發疹、瘙癢症、背痛、頭昏、眼花、昏睡、眩暈等每 350 名患者不會超過一個。

6. 腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。

貯存條件：室溫遮光。請貯存於陰暗處及幼孩伸手不及之處。

包裝：16~1,000 錠瓶裝、盒裝。

賦形劑：

Microcrystalline cellulose (Avicel 101)
Hydroxypropyl cellulose
Primojel
Magnesium stearate



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號 ㊦