

“信東”

# 艾歐隆 錠 200 毫克 (艾米達隆) AMIORONE Tablets 200 mg (Amiodarone)

本品是歷經十年餘精心研製而成之心律不整治療劑，是經法國醫學界400多位心臟病專家經多年之臨床研究一致推薦確實為目前治療與預防心律不整之有效治療劑。本品效能迅速，最大之優異係對患有消化性潰瘍、氣喘、支氣管炎和心臟官能不足之病者也可安心使用。

## 成 分：

主成分：每錠含：

Amiodarone Hydrochloride.....  
.....200mg

賦形劑：Lactose Monohydrate、  
Microcrystalline Cellulose、  
Povidone、Sodium Starch  
Glycolate、Magnesium Stearate。

## 藥理作用：

本品係alpha和beta感受體抑制劑用於：

- I、抗心律不整時 (Anti-Arrhythmic)
  - 促進心肌功能。
  - 延長心臟纖維之電位動作期而不影響心搏數之上升。
  - 降低竇房結之自動活力，產生誘導心動徐緩之效能。
  - 緩慢心房竇、心房、竇房結和心房與心室間之傳導。
  - 不改變心室內之傳導。
  - 增長心房與心室間之反拗期、降低心房、心結和心室之心肌興奮度。

### I、用於下列心律不整症：

1. 上室性及心室性心搏過速。
2. 心房撲動。
3. 心房纖維顫動。
4. 心室纖維顫動。

當使用其他抗心律不整劑治療wolff-parkinson-white癥群之病例無效時，本品是最好之預防和治療劑。

## 適 應 症：

wolff-parkinson-white氏症候群，上室性及心室性心搏過速、心房撲動、心房纖維顫動、心室纖維顫動。

「本藥副作用大係屬第二線藥，故須在其他藥品無法使用時選用本藥」

## 副 作 用：

有些病患使用本品後可能產生過敏反應，頭痛、關節痛、心動徐緩、皮膚色素沉著、對光過敏反應、暫時性血壓降低、瞬時面紅、發汗和短暫性嘔吐，但完全無害，只要減少用量即可改善。

## 禁 忌 症：

- 房竇心動徐緩，自發性或繼發性房竇傳導不全。
- 心房與心室間傳導不全，Q.T. 期有延長現象時。
- 甲狀腺功能異常或對碘起過敏反應者。
- 孕婦。
- 嚴重性動脈低血壓。
- 心臟血管虛脫。
- 忌和MAO抑制劑或beta阻斷藥（如Segontin Isoptin）共用。

## 注 意：

使用本品期間請避免在陽光下直接曝曬，且須時時觀察血壓變化，有些病患使用本品後靠近其瞳孔眼角膜兩側呈現細小之黃褐色沉著物，但停止用藥或減低用量後即可消退。

超過5mg/kg，在動脈壓下降、嚴重呼吸不全、嚴重心機能不全病患，須小心使用。

## 用 法 用 量：

本藥須由醫師處方使用。  
初次使用，飯後每次一錠，每日兩次至三次。  
8~10天後，每週固定連服5天，停用2天，每天一錠至兩錠。

## 包 裝：

4~1000錠瓶裝及盒裝。

衛署藥製字第028041號 G-0140



信東生技股份有限公司  
桃園市桃園區介壽路22號

54011030⑥