

香港腳、灰指甲、頑癬之口服治療劑



膚友<sup>®</sup> 錠 125毫克，500毫克  
FUYOU<sup>®</sup> Tab. 125, 500mg

本品係一種對淺表皮黴菌病特具功效之抗生素，口服由胃腸吸收後，能沈著於新生之皮膚、毛髮、指甲等組織中，形成堅強的抵抗層，不但能抑制黴菌之生長，而且能阻止其侵入新生細胞中，如此待原受黴菌感染之皮膚、毛髮、指甲成長脫落後，即由未被黴菌感染之新組織取而代之，而能得到完全之治癒。所以膚友錠堪稱為香港腳、灰指甲、髮癬、以及各種皮膚頑癬之根治藥。

【成 分】

膚友錠125毫克，每錠含有：

Griseofulvin ..... 125mg (Potency)

膚友錠500毫克，每錠含有：

Griseofulvin ..... 500mg (Potency)

【賦形劑】

膚友錠125毫克： Starch、Primojel、Magnesium Stearate

膚友錠500毫克： Lactose、Starch、Povidone K-30、Polyethylene Glycol

6000、Primojel、Magnesium Stearate、Aerosil

【藥理作用】

①Griseofulvin 對皮膚角質 (Keratin) 有特別的親合力，尤其是有病變之組織。當它被吸收後，即沈積于角質形成細胞內，然後跟新形成的角質牢牢結合，而形成堅強的保護層，有抵抗黴菌內侵之功能。再隨著皮質的代謝，保護層逐步向外推展，含菌組織慢慢脫落，於是患部便漸漸痊癒。

②Griseofulvin 能于黴菌合成核酸 (Nucleic acid) 時，阻止其聚合作用，而呈強力的抗黴菌效能。

【適應症】

甲癬 (Onychomycosis)、髮癬 (Tinea Capitis)，不適宜局部外用治療或局部外用無效的皮膚黴菌感染。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

通常成人每日劑量500 mg分1~4次服用，兒童請按每日125~250 mg分數次服用。

療程長短以感染之程度及部位而定，一般約需至少連續服用四星期，但指(趾)甲感染可能需要延長至六~十二個月或臨床症狀消失後再繼續服用二星期。

【注意事項】

①對紫質病症患者、肝障礙病患及使用本劑曾生過敏之患者，禁用本品。

②對 SLE 或有此素因之病患使用本劑恐會增惡或誘發 SLE，須慎重投與。

③副作用：

a.稀有過敏性血管神經性浮腫、光線過敏之出現，發現有時停止使用本品。

b.皮膚偶有出現發疹、紅斑、剝脫性皮膚炎、色素沈著等症狀。

c.偶有出現白血球減少、顆粒球減少、白血球增加等症狀。

d.肝臟方面偶有 GOT 之上昇，BSP 之排泄弛緩出現。

e.偶有食慾不振、噁心、嘔吐、下痢、心窩部疼痛、又稀有味覺異常、舌痛、口渴等症狀出現。

f.精神神經系方面偶有出現頭暈、頭痛、頭重、嗜眠、不眠又稀有耳鳴、精神錯亂、抑鬱狀態、視力障礙、末梢神經炎等症狀出現。

g.腎臟偶有蛋白尿等症狀出現。

h.代謝異常：稀有紫質病出現。

i.其他偶有倦怠感、發熱、關節痛又稀有女性型乳房出現。

④妊娠之投與：動物實驗有催畸型作用之報告，所以妊娠或有妊娠可能之婦人應經判斷治療上之有益性大於其危險性時才能投與。

⑤相互作用：

- a.本品會增強酒精（Alcohol）之作用，又會使 Warforin 系口服抗凝血劑之作用減弱，故併用時須注意用量。
- b.巴比妥酸塩類（Barbiturates）會降低本品之藥效，故併用時，應特別注意用量。

⑥長期投與時，須定期作肝機能、腎機能及血液等檢查。

⑦本品投與中，附著有皮膚絲狀菌之角質素會逐漸脫落，故應併用適當之局部療法。

⑧Mouse 長期大量經口投與（臨床用量的約75~375倍）後有認為特別雄性肝腫瘍發生增加之報告，又 Rat 長期經口投與（臨床用量的約10~100倍）後有認為甲狀腺腫瘤發生增加之報告。

【儲存條件】

請儲存於25°C以下。

【包 裝】

膚友錠125毫克：10-1000粒瓶裝、罐裝。

膚友錠500毫克：2-1000粒瓶、罐裝。

瑞士藥廠股份有限公司

SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.

新市廠：臺南市新市區中山路182號