

貧血治療劑

衛署藥製字第 028066 號

血補維他糖衣錠

Hebovita Tablets

網號：E08

本劑為治療貧血有效的鐵劑，再配加抗惡性貧血因子維生素 B₁₂、葉酸及水溶性維生素。由全部成分之綜合治療效果及相乘作用，不論對鐵份缺乏性之貧血或其他各種貧血症均有顯著功效。

成分：每錠含有：

Ferrous Sulfate Dried 50mg (eq. to Iron 18.2mg)
Folic Acid1mg
Thiamine Mononitrate(B₁).....5mg
Riboflavin(B₂).....1mg
Cyanocobalamin(B₁₂).....3.875mcg
Ascorbic Acid(C).....20mg

藥效：本劑所含各有效成分之藥效如下：鐵份為人體內血色素之形成不可缺少之成分，而根據最近臨床實驗之報告，維生素 B₂ 及 C 對鐵在腸粘膜內之吸收更具有調節作用，即使其還原為容易被吸收之鐵份。至於維生素 B₁₂、葉酸等成分則以抗惡性貧血因素廣受治療界之實用，各成分之併用，對貧血治療更能發揮顯著功效。

此外水溶性維生素 B₁ 及 C，對人體有促進新陳代謝，增進肝機能之作用，可防止因貧血而來之體力消耗，故對全身症狀之恢復極有幫助。本劑依上面各種成分之綜合相乘作用，對所有貧血症狀之治療，均極理想。

適應症：

出血及病性所引起之貧血症，低色素性貧血，再生不良性貧血，惡性貧血，缺鐵性貧血。

用法、用量：本藥須由醫師處方使用。

通常成人每次一~二片，一天三次，於飯後立刻服用。小兒適宜減量之。

注意事項：

- 1.視貧血原因，如寄生蟲性貧血，感染性貧血等，須併用原因療法。
- 2.服用本劑前後，須避免茶及咖啡之併用。
- 3.本劑易潮濕，因此啟開後請從速密蓋，儲存於乾燥處。
- 4.須置於小孩接觸不到之處。
- 5.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 6.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
- 7.三個月以下嬰兒不宜使用。

包裝：12~1,000 錠塑膠瓶及玻璃瓶裝、鋁箔盒裝。

賦形劑：Sucrose, Lactose, Starch tapioca, Povidone K30, Microcrystalline cellulose (Avicel 102), Magnesium stearate, HPMC 15 cps, Shellac wax, Castor oil hydrogenated, Simethicone, Gelatin, Acacia, Calcium carbonate precipitate, Talc, Propylene oxide-ethylene oxide copolymer, Titanium dioxide, Food Color Red No. 3, Color Yellow No. 6 (Al-Lake), Bees Wax



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號

