

500mlX20

信東

汎達研

注射液

適應症：

在開刀後（惡性腫瘤、火傷、發熱性疾病、甲狀腺中毒症、腹膜炎、後腹膜腐敗症及傷口感染症狀）須要維他命乙群及丙的供給時、或因胃腸疾病、酒精中毒不能吃食物時可與綜合胺基酸、葡萄糖液共同使用之。

用法・用量：

請詳閱說明書。  
本藥限由醫師使用。

注意事項：

使用前請先搖搖，如發現藥液有異物或藥瓶有破損，請勿使用。  
請詳閱說明書。

衛署藥製字第028542號

信東生技股份有限公司

桃園市介壽路22號

Pantogen

injection 500ml

每ml中含有：

Dextrose	50mg
Ascorbic Acid	1.0mg
Thiamine HCl	0.25mg
Riboflavin	0.05mg
Nicotinamide	0.25mg
Pyridoxine HCl	0.05mg
d-Pantothenyl Alcohol	0.5mg

WARNING:

1. Because Pantogen contains pantothenyl alcohol, when it is necessary to inject succinyl choline or neostigmine, succinyl choline or neostigmine should be given 1 hour and 12 hours, respectively, after Pantogen is given.
2. Do not use in patients with anaphylaxis of Thiamine and Nicotinamide.

Lot No.:

Exp. date:

