

“衛達”**達膚治** 乳膏 0.5 毫克 / 公克
DERMOCURE CREAM 0.5MG/GM "WEIDAR"

GMP G-0313



[成份] :
每公克 (含) :
Clobetasol Propionate 0.5mg
助剂用 : Benzyl Alcohol · D-Sorbitol Soln 70% · Propylene Glycol · Glycerin · PEG-40
Steearate · Euungolin · EDTA · Sodium Hydrochloric Acid · 12H2O
Isopropyl Palmitate · Colloidal Oatmeal · Cetyl Alcohol · Squalane · White
Petrolatum · Glycerol Monostearate · Dimethylpolysiloxane · Floral(Flavor)
Polyoxyethylene Oleyl Ether · DL-α-Tocopherol Acetate · Purified Water ·

[適應症] : 牛皮癬、脂溢性皮膚炎、濕疹、體膚紅斑性疾患。

[用法用量] :

半身或四肢局部酌量使用。

[注意事項] :

成人

塗上藥膏可使整塊皮膚變紅，即時使用。輕輕按摩，每次使用 1 或 2 次，最多 4 次，直到症狀改善為止。之後再重新塗上藥膏，或改用藥效較低的藥膏。每次抹後應靜待一段時間，以免吸收過量。

可重複使用程度較高的 clobetasol propionate 治療，控制症狀作用。

對於較敏感的部位，特別是角質過度增生的部位，則可能必須使用，以 PE 膜蓋在症狀藥物的表面，並在表面塗上藥膏，然後再將 PE 膜移除，以達到理想的改善。可覆蓋過夜，惟一日有時需要更頻繁地使用藥膏。

如病況惡化並未消失，應改用其他藥物，或請用藥效較強的藥劑。

每公克約 50 毫克。

異位性皮膚炎 (搔癢)

症狀擴張後，應逐步使用 clobetasol 治療。

突然停用 clobetasol 可能會造成原有皮膚病原的症狀復發且更為嚴重。

特殊說明

兒童

Clobetasol 用途於 1 歲以上的兒童。

某些情形下，兒童易發生局部與全身性副作用，一般來說，兒童所需的療程時間比成年人長，需要的藥物劑量也較低。

應小心使用 clobetasol propionate，以確保用量可發揮極大的最小劑量。

老人

老年人並非老年人，其對藥品反應的差異，老年人肝腎功能下降的比例最高。

若藥品完全吸收，其排除速度可能會降低。因此應盡量減少用量並縮短療程，以達到期望的臨床效果。

胃部不適感

若發生胃部不適感 (長期塗抹於體表大範圍時)，代謝與排除可能會減緩，因而提高全身性毒性的危險。

[禁忌] :

未經治療之皮膚感染

有下列情形者禁用 clobetasol :

● 對本品或其成分或類似藥物過敏的患者

● 溲道癌

● 專常性扭傷

● 眼睛或眼周的搔癢

● 耳門或鼻孔附近的搔癢

● 口腔或喉嚨炎 (Perioral dermatitis)

Clobetasol 禁用於：歲以下兒童之皮膚疾病，包括皮膚炎及尿布疹。

[藥理及作用] :

抑制免疫系統的治療。

Clobetasol 用於反覆因皮膚問題引發局部過敏病史，或曾對劇烈內任何皮膚過敏的患者時，應特別小心。局部過敏反應（參閱不良反應）的症狀可能與正在治療的症狀相似。

某些情形下，即使使用局部皮膚藥膏，也會在治療時可能產生皮膚過敏反應多發（單次反應症狀，或多次反應症狀，或兩種反應都有）。當上述情形發生時，應停止治療，並在停止治療後幾天內，逐漸減少藥物濃度，或是另換較低劑量的皮膚藥膏，或停止治療可能造成皮膚問題的缺乏（非藥不良反應）。

全身吸收與局部吸收：

● 藥膏吸收的時間與劑量

● 藥膏吸收的時間

● 用於面部與身體表面

● 用於面部與身體表面 (如，對臉頰部位或密閉敷料 (包括嬰兒的尿布) 下的部位)

● 角質層水份增加

● 用於面部等處處理的部位

● 用於面部等處處理的部位

相關於成人，較少數的藥物吸收量與局部吸收的百分率會更高，因此容易發生全身不良反應，主要是因為兒童的皮膚屏障尚未發育成熟，且藥物吸收相對於體重的比值高於成人。

全身吸收與局部吸收：

● 用於面部與身體表面

● 用於面部與身體表面 (如，對臉頰部位或密閉敷料 (包括嬰兒的尿布) 下的部位)

● 角質層水份增加

● 用於面部等處處理的部位

● 用於面部等處處理的部位