"天良" 服舒康錠

"T.L.B" Fusucon Tablets

本品係Al-Hydroxide Gel及Mg-Hydroxide等二種制酸劑和Simethicone的配合，除可中和過多胃酸，並可消除脹氣，其作用如下：

1. Mg-Hydroxide直接中和胃酸，緩解氫氧化鋁可能引起的便秘。

【成分】每錠含

Dried Aluminum Gel Hydroxide.....200mg
(equivalent to Aluminum Hydroxide 153.8mg)
Magnesiun Hydroxide.....200mg
Simethicone.....20mg

【賦形劑】Cochineal Red A、Menthol、Saocharin Sodium、Lactose、Starch、Magnesium Stearate

單次劑量（2錠）之酸中和能力為17.45mEq以上，鎂含量為13.7mEq。

【適應症】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多，解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

【用法用量】

一天3次，或需要時服用。應嚼碎後吞服。成人每次2錠，12歲以上適用成人劑量；6歲以上未滿12歲，每次1錠；3歲以上未滿6歲，每次1/2錠；3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

一、為防止兒童誤食請妥善保管。
二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
三、除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
五、腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症（Dialysis Osteomalacia）、透析性腦病變（Dialysis encephalopathy）及低磷血症，應謹慎小心使用。

警語

一、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
（一）對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過5g。
（二）未滿3個月之嬰兒不得服用。
（三）一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
（四）本藥不得併用其他藥品。
二、如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
三、消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
四、本藥含鋁之制酸成分可能會引起便秘，偶有噁心、嘔吐。
五、本藥含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。

【包裝】12～1000錠塑膠瓶裝　　請於25℃以下儲存
【許可字號】衛署藥製字第029017號

委託者：天良生物科技企業股份有限公司　新北市汐止區大同路一段147號9樓
製造廠：合誠化學製藥股份有限公司　桃園市平鎮區工業十路15號
免費服務電話：0800-251-197