胃痛、胸悶、消化不良治療用

“田邊”胃腸藥優錠

（衛署藥製字第029359號）④

“田邊”胃腸藥－優錠係配合制酸劑、粘膜保護劑，Extract Scopolia, 消化酵素、利膽劑等，而製成外層爲白色，內核爲帶有淡褐色～淡黃褐色斑點的灰白色～淡黃色的有核錠。其中Methylmethionine Sulfonium Chloride 這種成分具有些微的特殊氣味。

服用本劑後，外層的制酸劑具有調整胃酸的作用，然後內核的各種成分才發揮作用。

【 成分 】(1錠中)

有效成分及含量

外層

Magnesium Aluminometasilicate(無水化合物)…… 120mg

內核

Methylmethionine Sulfonium Chloride…… 10mg

L-Histidine Hydrochloride…… 6.7mg

Dehydrocholic Acid…… 16.7mg

Biodiastase 2000…… 8.3mg

Extract Scopolia…… 3.3mg

其他成分(賦形劑)

Calcium Citrate、Crystalline Cellulose、Corn Starch、Calcium Carboxymethyl Cellulose、Magnesium Stearate、Dextrin、L-Menthol

【 用途(適應症) 】

胃痛、胃酸過多、胃灼熱感、胸悶、打嗝、胃部停滯感、胃部膨滿感、噁心、嘔吐、食慾不振、消化不良。

【 使用上注意事項 】

1.有下列情形者，請勿使用：

(1)曾因本藥成分引起過敏的人。

(2)未滿5歲。

2.有下列情形者，使用前請洽醫師診治:

(1)消化道潰瘍的人。

(2)腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用。)

3.有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生:

(1)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(2)與其他藥品併用時。

4.其他使用上注意事項:

(1) 為防止兒童誤食請妥善保管。

(2) 避免陽光直射。

(3) 勿超過建議使用量。

(4) 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。

(5) 超過保存期限，請勿使用。

(6) 制酸劑之錠劑應嚼碎後吞服。

【 用法用量 】

年 齡	劑 量
15歲以上	一次3錠
11歲以上未滿15歲	一次2錠
5歲以上未滿11歲	一次1錠

1日3次，飯後服用。

【 警語 】

1.服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生:

身體部位	副作用
胃腸道	口乾、便祕、腹瀉
皮膚	發疹、發紅、搔癢

2.服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治:

(1) 若有任何不適情況產生。

(2) 連續服用2週後，若症狀沒有改善。

【 類　　別 】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【 包　　裝 】18～1000錠玻璃瓶裝。

【 儲存條件 】請存放於25℃以下陰涼處所。

製造廠:台灣田邊製藥股份有限公司新竹廠
廠　址:新竹縣湖口鄉光復北路97號
藥　商:台灣田邊製藥股份有限公司
地　址:台北市南港區市民大道七段8號14樓之1