



抗焦慮劑  
**律靜®**  
(歐拉)  
**Lutin®**  
(Oxazolam)

LTC-006  
衛署藥製字第029476號

膠囊 10公絲

Capsules 10mg

3.98cm

【成 分 名】 Oxazolam

【劑型・含量】 膠囊劑：每膠囊含Oxazolam.....10mg

【賦 形 劑】

Lactose、Colloidal Silicon Dioxide、Magnesium Stearate、Talc、Capsule #4 (Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide)。

【臨 床 藥 理】

藥效藥理—

- 對於(Mouse、Hamster、Rat、Monkey)衝突反應、狂暴性、攻擊性、興奮等的實驗動物情緒障礙之抑制作用（靜穩作用、馴化作用）很明顯，另一方面，催眠、肌肉遲緩、步行失調等的自發性行動抑制作用較弱(Mouse)，條件迴避反應的抑制也較少(Rat)。
- 關於靜穩作用，從貓、兔子的實驗中，推定其係特異的作用在扁桃核下視丘之大腦邊緣系的結果。對於人體意識水準的變化，檢討顯示腦的興奮水準的光一眼輪肌肉反射的影響，並無抑制作用，對於腦幹網樣體－新皮質賦活性（意識水準）幾乎無影響。
- 對於經由Megimide、Pentetetrazol引起陣發性痙攣(Mouse、Rat)，振動誘發痙攣(E1 mouse)有抑制效果。

藥物動力學—

依文獻資料：健康成人七例中，空腹時一次經口投與20mg後的血液中，均有變化物質，其主要代謝物是N-desmethyliazepam，尿中主要代謝物是2-amino-5-chlor-4-hydroxybenzophenone(ACHB)和其共軛體及2-amino-5-chlorobenzophenone(ACB)。

【適 應 症】

焦慮狀態。

【用法・用量】

本藥須由醫師處方使用。

- 治療時，通常成人每次10~20mg，一日3次。
- 麻醉前投藥時，通常手術前每kg體重以1~2mg口服。
- 視年齡症狀，可適宜增減。

【注 意 事 項】

一般注意：因為會引起嗜睡、注意力、集中力、反射運動能力降低，故儘量不要從事開車等伴有危險性的機械操作。

禁 忌：(1) 急性狹角性青光眼之患者。

(2) 重症肌無力症之患者。

慎重服用：心臟病、肝病、腎病之患者、腦部功能障礙者、嬰兒、小孩、衰弱病患、中等度或嚴重的呼吸不全患者、高齡者（請參照高齡者的投與）。

對孕婦的投與：(1) 據免疫學之調查報告，懷孕中病患，投與其他的Benzodiazepine系化合物時，和對照群比較之下產生畸形兒等之殘障兒比例非常的多，故孕婦（3個月以內）只能在被判斷治療上有益，且在挽救危機時服用。

(2) 據報告，服用Benzodiazepine系化合物(Diazepam、Nitrazepam)會使新生兒發生哺乳困難、肌張力降低下、嗜睡、黃疸的增強等症狀。故懷孕後期的婦女只能在被判斷治療上有益，且在挽救危機時才服用。

(3) 因有其他Benzodiazepine系化合物(Diazepam)，移行至母乳中引起新生兒嗜睡，體重減輕等之報告，而也會有黃疸增強的可能性，所以授乳婦要避免服用。

(4) 因有其他Benzodiazepine系化合物(Diazepam)，在分娩前連續服用時，出生後的新born有出現禁斷症狀（神經過敏、震顫、過度緊張等之報告）。

對高齡者的投與：因對高齡者的投與，很容易出現運動失調等副作用，故開始時應從少量慎重服藥。使用本藥品時併用葡萄柚或葡萄柚汁時，應注意可能產生的藥品相互作用。

依據隨機分派，有對照組的臨床試驗(Randomized controlled trial，RCT)臨床試驗及回溯性世代研究(Retrospective cohort study)發現，抗精神病藥品，包括傳統(Conventional)與非典型(Atypical)之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患(dementia-related psychosis)的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性較高。

【相 互 作 用】

和下列藥品併用(Phenothiazine類衍生物、Barbiturate類衍生物等中樞神經抑制劑、MAO Inhibitors)或是酒精類會增強其作用。

【副 作 用】

1. 依 賴 性：Benzodiazepine系化合物大量連續服用時，偶而會引起藥物依賴，因有此報告，故對本藥的投與需詳細的慎重觀察，不可過量，長期服用如需停藥時，則需注意要慢慢的進行減量。

2. 精神、神經系統：有時會有睡意、蹣跚、頭昏、頭痛、失眠、舌頭不靈活，偶而也會有焦急不安定的現象出現。

3. 循環系統：麻醉前投藥偶而會有頻脈現象。

4. 消化系統：有噁心、便祕、食慾不振、胃部不舒服、下痢、口渴之現象，偶而也會有嘔吐之現象。

5. 過 敏 症：如有發疹、蕁麻疹等過敏症狀出現時請停止服藥。

6. 骨 骼 肌：有時會有倦怠感等肌張力降低症狀。

【保 存 上 之 注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。

2. 於25°C以下儲存。

3. 請在有效期限內使用。

【包 裝】

6~1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。



永信藥品工業股份有限公司  
YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2145472