衛署藥製字第 029503 號

政德 優寧錠 3 公絲（布馬平）

BROPAN Tab. 〝Gentle〞 3mg (Bromazepam)

優寧錠具有強力抗不安作用，低劑量可以解除緊張和焦慮，高劑量具有鎮靜作用。藥理作用靜穩及抗不安作用約為 Diazepam 之 5 倍。本品口服使用後由 1 小時達最高血中濃度，在 72 小時約 70~80%自尿中排泄。對情緒上之困擾引起之諸症，精神生理之不適等皆具療效。

成　分　：　每錠含　　主成分
Bromazepam……..... 3mg
賦形劑
Lactose
Starch
Avicel
New coccine
Magnesium Stearate

適應症　：　焦慮狀態。

用法用量：　通常每次一錠，一天 2~3 次，嚴重症狀可增至一次 2~4 錠一天 2~3 次，應由最低劑量開始逐漸增量。
本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

1.急性狹隅角綠內障患者及重症筋無力患者禁止使用。

2.腎、心、肝臟障害，腦器質障害，嬰幼兒、高齡及衰弱者等慎重投與。

3.副作用：

① 大量連續使用，會產生依賴性，大量連續投與後立即停藥或急速減量會產生禁斷症狀。

② 出現步行失調、不眠、頭痛、性慾影響、振顫、霧視、構音障害。(減少量即會消失)。

③ 白血球減少、血壓下降，alkaline phosphatase 上升，urobilinogen 陽性及口渴、食慾不振、噁心、便秘、胃部不快、排尿困難、疲勞感、脫力感等肌緊張低下症狀。

④ 若有過敏症狀發生應即中止用藥。

4.孕婦及授乳婦：

① 懷孕三個月以內應衡量有益性與危險性而決定使用。

② 妊娠後期會引起新生兒哺乳困難，肌緊張低下、嗜眠、黃疸增強等症狀。

③ 分娩前連續使用產後新生兒有禁斷症狀產生。

④ 本藥會在母乳中移行，新生兒因而引起嗜眠、體重減少現象。

5.小兒投與之安全性尚未建立。

6.併用藥物或飲酒會增強作用須慎重投與。

7.會有睡意、注意力、集中力，反射運動功能低下，駕駛及操作機械必須注意。

警語：

依據隨機分派，有對照組的臨床試驗(Randomized controlledtrial，RCT)臨床試驗即回溯性世代研究(Retrospective cohort study)發現，抗精神病藥品，包括傳統(Conventional)與非典型(Atypical)之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患(dementia-relatrd psychosis)的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性提高。

包　裝　：　6~1000's 瓶裝
10's×10 PTP 盒裝。

貯存條件：

本藥品請置於緊密容器，室溫 30℃下貯存。

GP 政德製藥股份有限公司
雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路 2 號