衛署藥製字第029504號

〝政德〞

樂華定 注射劑1000公絲(西華定)

Lofadine Injection 1000mg 〝Gentle〞(Cephradine)

Lofadine 為新合成 Cephalosporin，是一種廣效性抗生素。對大部份革蘭氏陽性和陰性菌均具殺菌作用，對於會產生青黴素酶(Penicillinase)之菌種亦具療效。由於吸收良好，Cephradine 適合於口服及注射治療，本藥以高濃度經由腎臟排泄於尿中，因在體內不被代謝，本品對於泌尿道感染有效。本品不含鈉鹽(Sodium free)，可適用於特定患者。

Lofadine 主要用於治療生殖泌尿道、胃腸道、呼吸道、皮膚及軟組織等具感受性病菌引起之感染。

成　　分：

每 Vial 含:

主成份：

Cephradine……1000mg (Potency)

(As Cephradine for Injection：mixture of Cephradine and Arginine)

賦形劑：無

適 應 症：

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

用法用量：

成人一般用量一次 500mg，一日四次，對於嚴重及慢性感染可使用一次 lgm，一日四次。加注射用水溶解後可由深部肌肉或靜脈注射。小孩一日量按每公斤體重 50~100mg 分四次使用，一日最大量不得超過 4gm。

注意事項：

1. 不適用於對 Cephalosporin 過敏之患者，對 Penicillin 有過敏者，應小心使用。
2. 使用於腎機能不全者須減少劑量，且臨床上的觀察及檢驗是必須的。
3. Cephalosporins 與 Aminoglycosides 併用有增加腎毒性的可能。
4. 對部份藥物有過敏之患者，除非絕對必要，使用時應小心。
5. 雖未發現有畸型胎，但在孕婦的安全性尚未建立，使用於孕婦時須衡量對患者之有益性和對胎兒之危險性而決定，且會經由乳汁中排泄。
6. 使用於嬰兒時須衡量益處及危險性而決定。
7. 會影響臨床檢查，呈現尿糖陽性值。
8. 副作用:主要為胃腸症狀，舌炎、噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚疹、水腫、發紅、發赤、癢、關節痛、嗜伊紅血球減少、白血球減少症、嗜中性血球減少，引起 SGOT、SGPT 上升，Total alkaline Phosphatase、LDH 升高，以及 BUN 輕微升高。
9. 其他副作用:頭痛、眩暈、呼吸困難、感覺異常、念珠菌過度繁殖、念珠菌陰道炎、肝腫和注射部位的血栓性靜脈炎。
10. 嚴重的過敏反應須以 Epinephrine、Oxygen、Intravenous Steroid 和 Airway management 急救。
11. 藥品溶解後須於 2 小時內使用，放置冰箱時須於 24 小時內使用。若與輸注液或電解質液如 5%葡萄糖、生理食鹽水、林格爾、乳酸鈉液等混合時在 30mg/ml 濃度以下可保存 8 小時。

貯　　存：本品置陰涼處所貯存有效期間三年。

類　　別：本藥限由醫師使用。

包　　裝：每小瓶 1000 公絲，100 支以下盒裝。

政德製藥股份有限公司

雲林縣大埤鄉豐田工業區豐田路 2 號