

“台裕” 益力糖 注射液

## Electrose Injection “Tai Yu”

### 【成分】

Each ml contains:

Dextrose Monohydrate.....25.0mg

Sodium Chloride..... 4.5mg

pH : 3.5~6.5。

電解質組成(mEq/L) : Na<sup>+</sup>77, Cl<sup>-</sup>77。

熱量(cal/L) : 102。

滲透壓比: 約 1。

### 【適應症】

脫水症及病態不明時之水分、電解質初期補給，手術前後水分、電解質之補給。

### 【用法用量】

本藥限由醫師使用。

成人每次 250~1000ml 靜脈點滴注射，投藥速度以每小時 300~500ml 為宜  
(即為每分鐘約 80~130 滴為度)。

兒童用量由醫師酌減使用，但投藥速度以每小時 50~100ml 為宜。

### 【注意事項】

(一) 1. 腎疾患及腎臟功能不全之患者、心臟功能不全、閉塞性尿路疾患而致尿量減少之患者、糖尿病患者，應慎重投藥。

2. 大量急速投藥，副作用有：腦浮腫、肺水腫、末梢性水腫等現象。

3. 用前應詳予檢視，如溶液為澄清透明方可使用；輸液玻璃瓶裝者應再拍打瓶底，如有反彈之中空清脆聲(真空)，方可使用。

(二) 取用時：

1. 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。

2. 若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

(三) 輸液套選用及插入法：

1. 請依輸液套使用方法正確使用。

2. 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞；插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。

3. 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

【賦形劑】 Water for Injection

【貯藏方法】 室溫避光貯存。

【包裝】 250ml、500ml、1000ml 玻璃瓶、塑膠瓶及軟袋，100 支(袋)以下盒裝。



台裕化學製藥廠股份有限公司

TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號

TEL : (03)5826655

FAX : (03)5822389