



抗原蟲製劑

服喜[®]

膜衣錠

(梯尼達諾)

Tinidazole

Film Coated Tablets "Yung Shin"

FNT5-003
衛署藥製字第029627號
Code No.:38064

3.98cm

服喜膜衣錠主成分是新開發的Tinidazole，係專門治療由陰道滴蟲、赤痢變形蟲及藍氏賈第(梨形)鞭毛蟲(Giardia lamblia)等原蟲感染症之新製劑。Tinidazole為Nitroimidazole系藥劑之新衍生物，呈微黃色晶體，具頗強之脂肪親和性。本藥於最近廣泛之臨床試驗證實其對一般成人型所罹患之原蟲感染症狀如鞭毛滴蟲、阿米巴症及梨形鞭毛蟲等，或由於上列症狀引致之白帶、搔癢感等現象，皆有極佳的療效，且副作用少，安全性高，為當今首選最佳療法的一種新抗原蟲治療劑。

【成 分】每錠中含：

Tinidazole.....500mg

【賦形劑】

Polyvinylpyrrolidone、Lactose、Sodium Lauryl Sulfate、Talc、Magnesium Stearate、Aluminum Magnesium Silicate (UFL2)、Sodium Starch Glycolate、Hydroxypropylmethylcellulose、Tartrazine Aluminum Lake、Titanium Dioxide、Polyethylene Glycol 400、Sunset Yellow FCF Lake。

【特 徵】

1. 對原蟲之治療，以口服本藥即具卓越的療效，不論男女，治療率達90%以上，無須再施局部療法。
2. 只需短暫的治療程(約3日)就呈完全殺鞭毛滴蟲效果，比現時一般之原蟲治療劑之治療程(約7~10日)之療法更簡便快捷。
3. 可同時給予男性配偶服用，消除鞭毛滴蟲的貯藏而避免再感染。
4. 對阿米巴赤痢及其他急性或慢性阿米巴症均可奏效。
5. 耐受性良好，極少數只有輕微腸胃不適之副作用而已。

【適應症】

男女兩性生殖泌尿系的陰道滴蟲症、變形蟲症及藍氏賈第(梨形)鞭毛蟲痢疾症(Giardiasis)。

【用法·用量】

使用本藥時宜設定治療程，以下列表所示之劑量及治療期間服用，會有優越之治療效果。

	用法·用量	治療期間
生殖泌尿系之陰道滴蟲症	每日服用1次，每次4錠	1日
變形蟲性肝膿瘍及其他腸外變形蟲症	每日服用1次，每次4錠	3日

本藥可於飯前或飯後經口服用。對兒童於最適當劑量未確定前，不宜服用。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1. 本藥如同其類似藥劑可產生短暫性白血球減少及中性血球減少症。
2. 治療期間不可飲用含有酒精成分的飲料，因該飲料與本藥的併用，能引起腹部絞痛、嘔吐及臉色潮紅。
3. 本藥如同其化學相類似之藥劑而有諸如耳鳴、眩暈及運動失調等神經障礙症狀，倘如本藥治療期間，上述諸神經症狀出現時，應立即停止治療。又患有血液性惡病質者或官能神經異常者，亦應避免使用。
4. 本藥於妊娠初期應禁忌使用，然而妊娠後期者，應小心謹慎使用。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25°C以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

8~1000錠瓶裝、罐裝、盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2140900