尿道及腸感染化學治療劑 衛署藥製字第**030322**號

“內外”威 克 林 錠500毫克
Weklin Tablets 500 mg “N.W.”

本藥須由醫師處方使用

本品威克林之主成分Nalidixic Acid係Naphthyridine系的新型衍生物經過多次臨床試驗結果，證實Nalidixic Acid對於革蘭氏陰性菌具有特殊功效，能將革蘭氏陰性球菌、桿菌殺害或抑制之。

Nalidixic Acid對於大多數之尿道感染及腸感染有最優越的治療效果，其抗菌效力包括大腸桿菌、數種變形桿菌、產氣桿菌、克雷白氏桿菌、淋病奈瑟氏菌、百日咳嗜血桿菌、志賀氏菌屬、沙門氏菌屬以及革蘭氏陽性之炭疽桿菌及魏氏桿菌。

Nalidixic Acid在治療由大腸桿菌引起之尿道感染及克雷白氏肺炎方面，其功效比使用磺胺劑、抗生素為優。

Nalidixic Acid口服吸收迅速，短時間即能發揮藥效，在服用本品時，因Nalidixic Acid在體內與糖羰基酸結合由尿中排出，由於糖羰基酸之存在，故在作尿糖之檢查(Benedict Fehling, Clinic Test)會呈現陽性，但這並不表示碳水化合物之代謝有問題。

【成分】Each Tablet contains:
Nalidixic Acid..... 500 mg

【適應症】細菌性痢疾、急慢性腸炎、急慢性尿路感染症(腎盂炎、膀胱炎、尿道炎)膽道感染症(膽囊炎、膽管炎)。

【用法用量】
成人一日四次，每次1~2錠，全日量(2~4 gm)，小孩依年齡體重施用之，通常一日量為25~50 mg/kg。

【注意事項】
1. 一個月以下嬰兒及懷孕三個月以內之孕婦不得使用本劑。
2. 繼續使用本劑一至二星期以上應作定期血液及肝臟機能試驗。
3. 糖尿病患者於服用本劑期間檢驗尿糖時應採用試紙法如Clinistix Testtap等而不宜使用Benedict Fehling或Clinic Test等法以避免錯誤，蓋因本品在體內即部份變成糖羰基結合物(glucuronic conjugate)排出體外，此時如使用還原法檢驗尿糖則易生錯誤。

【包裝】16~1000錠塑膠瓶裝。
【貯存】請於25℃以下保存，並放置在孩童無法取得處。

N.W. cGMP
內外化學工業股份有限公司
雲林縣斗六市斗六工業區復興路 3 號