依必朗殺菌消毒藥水

IBL ANTISEPTIC LIQUID

衛署藥製字第 030411 號

【成分】
有效成分及含量：每 100ml 中含有下列成分：
Chlorhexidine Gluconate ----------0.3g　　Cetrimide ----------3g

其他成分(賦形劑): Alcohol(95%)、Tartrazine、Sunset Yellow FCF、ALBEST I-30.3810、Civet Musk I-37.3830、Fragrance D-3998、Fragrance D-4015。

【用途(適應症)】一般外用消毒劑，可當作初步傷口處理。

【使用上注意事項】
◎有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏者。
◎有下列情形者，使用前請洽醫師診治：深部皮膚組織感染。
◎有下列情形者，使用前請諮詢醫師藥師藥劑生：
1.孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2.12 歲以下。
◎其他使用上注意事項:
1.為防止兒童誤食請妥善保管。
2.避免陽光直射。
3.勿超過建議使用劑量。
4.本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
5.使用前應依用法用量規定稀釋，以免灼燒皮膚。
6.避免接觸外耳道，尤其耳膜破裂時進入中耳，有造成耳聾之虞。

【用法用量】

個人衛生	1 瓶蓋(約 21ml)藥水混和浴缸內清水。
家庭衛生及醫院消毒病房	2/3 瓶蓋藥水混和清水 2 大杯(約 560ml)後使用。
防治頭皮屑	2/3 瓶蓋藥水與 1 大杯溫水混和,先浸濕頭髮及頭皮達 3 分鐘之久然後洗髮。
創傷面沖洗	2/3 瓶蓋藥水加清水 1 大杯後使用。
器械緊急消毒	2/3 瓶蓋藥水與 70% Alcohol 混和約 80ml 後使用。

【警語】
1.使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部分	副　　作　　用
皮膚	刺激感、皮膚炎、過敏性反應

2.使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
①若有任何不適情況產生。
②自覺狀況沒有改善或更惡化。

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品。
【包裝】 4000 毫升以下塑膠瓶裝。
【儲存條件】 儲存於 15-30℃，避免陽光直射。

製　造　廠：依必朗化學製藥股份有限公司　　地　址：彰化縣福興鄉福工路11號