

“優生” 舒您痛 錠200公絲(蘇林達克)

**Sulinton Tablets 200mg "Y.S"**  
(Sulindac)

衛署藥製字第 030612 號  
GMP G-0846 號

Sulindac 是一種新非類固醇，非水楊酸消炎劑，具有明顯的消炎、止痛作用，其消炎作用是因本品的硫化代謝物抑制前列腺素合成的結果，故對骨骼、關節之發炎甚具療效，可緩解痛感，改善關節之活動性，減少腫脹。

**【主要成分】：**每錠含量：

Sulindac ..... 200mg

**【作用特性】：**

1. Sulindac 之半衰期7~8小時，其硫化代謝物之半衰期16.4小時，故一天服用2次，即可維持血中有效濃度，亦可用於長期性的治療。
2. 對各種關節機能障礙具廣效性作用，對任何程度關節的疼痛及炎症之消除均有效。
3. 本品目前已取代 Aspirin 為歐美治療關節炎性疾患的標準品。

**【適應症】：**

骨關節炎、風濕性關節炎、關節粘連性脊椎炎、急性痛風性關節炎。

**【用法・用量】：**

通常成人一天2次，一次1錠，依年齡、症狀酌減之。本藥須由醫師處方使用。

**【注意事項】：**

1. 對本品有過敏現象，應即停藥。
2. 患有消化性潰瘍及胃腸道出血者，使用本品須小心。
3. 心機能不全，高血壓及其他有液體滯留傾向之病患需注意，因本品對某些人會造成周邊性水腫。
4. 具明顯腎機能不全者，可減少每日劑量，避免藥物積蓄。
5. 如測出肝機能不正常時，需校正劑量直至恢復正常，但若此不正常很明顯時，則應停止用藥。
6. 服用此藥，如有抱怨眼疾時，應做眼科治療。
7. 本品會抑制血小板機能，需注意。
8. 對正使用Corticosteroid 治療慢性風濕性關節炎之患者，本品可降低其用量，但一般需逐漸地減少其用量，突然中斷會引起 Adrenal Insufficiency。
9. 本品和抗凝血劑及降血糖劑合用時，需小心，和Probenecid 合用時，會適度地降低 Probenecid 的利尿酸作用，但一般情況下此作用不很明顯，而 Probenecid 亦會增加 Sulindac 之血中濃度。
10. 本品對正服用 Aspirin 或其他非固醇性消炎劑之急性氣喘、蕁麻疹及鼻炎之患者為禁忌。
11. 孕婦須由醫師衡量利弊後使用，哺乳婦使用本品時禁哺乳。

**【賦形劑】**

Lactose, Starch, Acetylated Distarch Glycerol, Sodium Starch Glycolate (Primojel), Magnesium Stearate

**【包裝】：**

4-1000 粒/塑膠瓶、鋁箔盒裝。



優生製藥廠股份有限公司

台中市南屯區工業區21路14號

MM 201512