

“黃氏”

**利舒安錠** 8 毫克 (鹽酸溴克辛)  
Lisuan Tablets 8mg “H.S.”  
( Bromhexine Hydrochloride )

**【藥理作用】**

本藥為 Benzylamine 的衍生物，可以促進支氣管分泌水分以稀釋氣管中的痰液，使得痰液容易被排出，進而使得呼吸道更加通暢。

**【成分】每錠有效成分及含量:**

Bromhexine Hydrochloride.....8mg

其他成分 (賦形劑):

Lactose、Corn Starch、PVP K#30、Tartrazine、Sodium Starch  
Glycolate、Magnesium Stearate。

**【用途(適應症)】**

祛痰。

**【使用上注意事項】**

一、有下列情形者，請勿使用：

(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾(慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起的咳嗽及咳嗽有濃痰的人。

(二) 3 歲以下。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

**四、其他使用上注意事項：**

- (一) 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
- (二) 避免陽光直射。
- (三) 勿超過建議使用量。
- (四) 不得與含酒精飲料併用。

**【用法用量】**

年 齡	每 日 使 用 量
成人及 12 歲以上	每次 1 錠，一天 3 次。
6 歲以上未滿 12 歲	每次 1/2 錠，一天 3 次。
3 歲以上未滿 6 歲	每次 1/4 錠，一天 3 次。
3 歲以下	請洽醫師診治。

**【警語】**

一、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一) 若有任何不適情形產生。

(二) 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上的咳嗽，或有復發情形。

**【包裝】** 6~1000 錠塑膠瓶裝。

**【類別】** 醫師藥師藥劑生指示藥品。

**【儲存條件】** 25°C 以下儲存。



PIC/S GMP 藥廠

**黃氏製藥股份有限公司**

HWANG'S Pharmaceutical Co., Ltd.

雲林縣小東里斗南鎮大同路 444 巷 11 號