

Glicron Glicron Glicron Glicron

"優生" 惠克糖 錠80公絲(葛立克拉)

Glicron Tablets 80mg "Yu Sheng"
(Gliclazide)

衛署藥製字第030698號
G.M.P. G-0891
LT-124-GR

【主要成份】

Gliclazide.....80mg

【適應症】

糖尿病。

【注意事項】

1. 警告：可能會引起重篤遷延性低血糖症，用法用量使用上須特別留意。
2. 一般的注意：
 - a 糖尿病的診斷於患者對血糖降下劑適用之考慮，糖尿病以外其耐糖能異常，尿糖陽性糖尿病類似症狀（腎性糖尿、老人性糖尿代謝異常、甲狀腺機能異常等）持有其疾患需留意。
 - b 適用糖尿病治療，基本食事療法、運動療法，考慮其十分可行性。
 - c 投與場合上需少量開始，血糖、尿糖須定期檢查並確定藥劑效果，如不十分良好時，速改其他治療法代替。
 - d 繼續投與，必要投與、須減量投與場合，患者本身不養生，合併感染症等其效果上不十分理想。
須留意食事攝取量，體重增減、血糖值、有無感染等常為可否繼續投與、投與量、藥劑選擇等依據。
 - e 注意重篤遷延性低血糖起因，低血糖症須十分徹底了解患者家族。
3. 禁忌：
 - a 昏睡性及昏睡前糖尿病，老年性糖尿病患者。
 - b 重篤肝、腎機能障礙患者。
 - c 重症感染症、手術前後、重篤外傷患者。
 - d 下痢、嘔吐等胃腸障礙患者。
4. 慢重投與：
 - a 肝、腎機能障礙患者。
 - b 由低血糖而引起如下狀態患者：
 - ①肝腎機能障礙②腦下垂體機能不全、副腎機能不全③營養不良狀態飢餓狀態、不規則食事攝取、食事攝取量不足致衰弱狀態④激烈筋肉運動⑤過度Ethanol攝取者⑥高齡者。
 - c 因低血糖而會引起事故之患者（從事高所作業、汽車駕駛）。

5. 副作用：

- a 低血糖：脫力感、高度空腹感、發汗、心悸亢進、振戰、頭痛、知覺異常，不安興奮、神經過敏、集中力低下、精神障礙、意識障礙、痙攣等症狀。
- b 血液：可能有貧血、白血球減少現象。
- c 肝臟：可能有肝機能障礙。
- d 腎臟：可能有BUN、Serum creatinine上升現象。
- e 胃腸：可能有食慾不振、嘔吐、噁心等症狀。
- f 過敏症：皮膚搔癢感發疹如與Sulfonylurea藥劑投與，曾有光線過敏症出現報告。
- g 其他：頭重、頭痛、熱感。

6. 妊娠投與：妊娠中投與其安全性尚未確立。

7. 小兒投與：小兒其安全性尚未確立。

8. 相互作用：與其他藥劑併用其對血糖降下作用之增強與減弱需十分觀察投與。
a 增強藥劑：Insulin製劑Biguanide、pyrazone系消炎劑(phenylbutazone等) probenecid、Coumarin系藥劑Salicylic acid劑、MAO阻斷劑、Sulfa drug、Dihydroergotamine藥。

b 減弱藥劑：副腎皮質藥劑、甲狀腺藥劑、卵泡劑、利尿劑。

9. 其他：Sulfonylurea系藥劑，長期連續投與及單獨食物療法場合之比較，心血管系統障礙之死亡率有增高之報告。

10. 室溫保存。

【用法・用量】

劑量按照糖尿病的嚴重程度由醫師決定之。

一般病例每天二錠。

嚴重病例每天三錠。

輕微病例每天一錠。

本藥須由醫師處方使用。

【賦形劑】

Lactose, Acacia (Gum Arabic), Talc, Magnesium Stearate.

【包裝】 瓶裝 6's—1000's
盒裝 6's—1000's

【代號】 GR-0124



優生製藥廠股份有限公司
台中市南屯區工業區21路14號

MM 201511