衛署藥製字第030753號

"內外" 安 日 能 錠2公絲（古阿若連磺酸鈉）

ANZULENE Tablets 2mg "N.W."

(Guaiazulene sodium sulfonate)

本品爲有特異七圓環構造Guaiazulene之衍生物，俱有優異之水溶性，作用迅速確實，俱有消炎，肉芽新生，上皮形成作用，及抗過敏作用，鎭痛，局麻作用。故本品爲優異之胃炎，胃潰瘍製劑，對於扁桃炎，咽喉頭炎，口內炎，嘶聲等疾患，將本品溶於溫水中作含漱劑有優異之治療效果。

□成分本質：

本品主成分爲Guaiazulene Sodium Sulfonate國際一般名爲Sodium gualenate (INN)有特異性七圓環構造Guaiazulene之衍生物，爲深藍色之結晶性粉末，溶於水，水溶液爲紫色，易溶於甲醇，乙醇，其溶液爲藍色，難溶於氯仿，不溶於石油苯。其分子式爲 $C_{15}H_{17}O_3SNa$

本品每錠內含Guaiazulene Sodium Sulfonate. 2mg.

□藥理作用：

1. 有強力炎症抑制效果，有肉芽新生作用及上皮形成之促進作用。
2. 有抑制組織之組織胺(Histamine)游離之作用。本品不影響下垂體副腎皮質系統而直接抑制Fibrinolysin之作用而且有阻止組織胺(Histamine)游離之效果。
3. 有促進腸管蠕動亢進作用，及鎭痛和局部麻醉作用。
4. 本品之急性毒性甚爲微弱，老鼠經口服用之LD_{50}爲1.17g/kg。治療量少，故臨床應用無副作用，可做爲長期之使用。
5. 臨床效果：對各種自覺症狀約有80%輕快，消失，特別是上腹部痛，吞酸，噁心均迅速好轉。

□適 應 症：

⊙急慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍及藥物引起之胃障碍。皮膚疾患之搔癢症。

□用法用量：

內服時一日 2 ～ 3 次，一次一錠，飯前30分服用。

本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

偶有腹瀉、便秘、腹痛、噁心、嘔吐、脹滿感、胃部不適、曖氣等消化器副作用。

❖包　　裝：

100'S（鋁箔裝）500'S，1000'S（瓶裝）。

內外化學工業股份有限公司

台灣省斗六市復興路3號