榮民雅蜜斯克蘭®黴素 250 公絲(西華定)

Askacef®Capsules 250mg,500mg
衛署藥製字第 030871 號

「作用」:

Askacef®(雅蜜斯克蘭®黴素)為新合成頭孢子菌素系(Cephalosporin)廣效性抗生素之一種。對大部份革蘭氏陽性和革蘭氏陰性細菌具有殺菌作用。且能有效作用於會產生青黴素酶，(Penicillinase)之菌種。由於吸收良好且迅速，故 Askacef®特別適合於口服治療，也可用於注射醫療。藥物以高濃度由腎臟排泄至尿中，因在體內未啟變藥物作用型態，故本品可應用於尿道感染治療。

「成份」:膠囊:每粒膠囊含有

Cephradine 500mg(力價)

「適應症」:

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

「說明」:

Askacef®主要用於治療生殖泌尿道、胃腸、呼吸道、皮膚及軟組織等被病因性細菌感染之疾病。

感染之細菌包括如下:

1.葡萄球菌感染-包括能產生青黴素酶及不能產生青黴素酶菌種。如膿腫、癤、支氣管炎、膿皰病。

2.鏈球菌感染-蜂窩組織炎、肺炎、濾泡性扁桃腺炎、中耳炎、咽炎、竇炎、猩紅熱、腐敗性潰瘍、喉頭及尿道感染。

3.肺炎球菌感染-大葉性肺炎、支氣管炎、蜂窩組織炎及中耳炎。

4.流行性嗜血菌感染-中耳炎、咽氣管支氣管炎。

5.大腸桿菌感染-膿腫和尿道感染。

6.克雷白氏菌屬感染-大葉性肺炎、尿道感染。

7.志賀氏菌屬感染-細菌性赤痢。

8.沙門氏菌屬感染-腸炎。

應先做細菌學之研討，依此來決定病因性細菌對 Askacef®感受程度及測驗治療效果。

用法用量:(本藥限由醫師處方使用)

膠囊劑:

成人:生殖泌尿道感染一般用量為每日四次一次 500mg，對複雜病情如前列腺炎，附睪炎須長期高濃度之治療。呼吸道感染一般用量為每日四次一次 250mg，胃腸道感染一般用量為每日三~四次，每次 500mg。

小孩一般用量，每日每公斤體重 25-50mg，分兩次或 4 次，等劑量服用。

中耳炎的劑量為每日每公斤體重 75-100mg，每 6-12 小時服用一次，口服最高劑量為 1 日 4gm。

對所有病人，不管年齡及體重、治療上最少應該維持 48 至 72 小時，以至無症狀及細菌感染現象。

如果是被嗜血性系鏈球菌感染、治療須 10 天，以保護發生關節炎或血管球性腎炎危險。

對慢性尿道感染，在治療期中，須常作細菌學和臨床檢驗，可繼續數月之治療。

對頑固感染須治療數週。因本品是 Cephalosporin 系中唯一口服和注射兩用之抗生素。在注射治療要改為口服治療上很方便，在用量上可維持一樣，不須考慮因不同藥物所產生不同效果。

「副作用」:

一般副作用微弱胃腸不適症狀。偶爾有皮膚反應，很少嚴重到須停止用藥治療程度，無牙齒色素沈著現象，對光過敏或血液性惡病質。

偶爾也有過敏性現象。與其他 Cephalosporin 大致相同因各別之過敏性背景如氣喘、乾草熱、蕁麻疹，或前曾用過而有過敏性現象者。

「注意事項」:

Penicillins 與 Cephalosporins 有部份性交叉過敏現象，因此 Askacef®對曾有 Penicillin 過敏性現象患者應小心使用。

因 Askacef®在血液和組織中有積蓄作用，故除非用量適當地減少，對腎功能不全者應注意臨床情況和腎功能檢查。

當與別種抗生素，長期使用，可能會引起無作用性

細菌之生長，如同所有的抗生素，長期使用會導致非感受性細菌的過份生長，由於產生毒素的梭狀芽胞桿菌會形成菌落，所以有可能引起結腸炎及假膜菌結腸炎。

如有嚴重腹瀉發生，應該停藥。

Cholestyramine 因可在結腸腔結合毒素，故可用於治療腹瀉。更嚴重的情況，則可用 Vancomycin 加以治療，必要時要給予液體電解質及蛋白質的補充治療，其它可能引起結腸炎的原因也要加以考慮，用 Askacef®治療時尿中，如用 Benedicts 或 Fehling 溶液或用 Clinitest 片測驗，可能會發生假葡萄糖正反應。但用酵基測定如 Clinistix 則無此反應。相同的，以 Cephalosponins 類治療，會發生假性 Coombs 測驗正反應。

妊婦之使用:

雖然動物研究中曾證明無妨害胎兒作用，但除非必須使用，否則在懷孕中，尤其是初期三個月內避免使用此藥。Cephradine 會由乳汁排泄，所以授乳母親應小心使用。

「禁忌」:

本品禁用於已知患者對 Cephalosponins 有過敏性之患者。

「貯存和安定性」:

膠囊:裝於防光線緊密容器內，置於冷暗乾燥處。

「細菌學」:

如下之細菌在體外試管試驗均有感受性作用。

(A)革蘭氏陽性細菌

Penicillin-sensitve Pencillin-resistant Staphylococci Streptococcus pyogenes,Group D streptococcus spp(entrococci)Sterptococcus pneumoniae

(B)革蘭氏陰性細菌

E.Coli,klebsiella spp,Proteus mirabilis,Proteus vulgaris,Haemophilus influenzae,Salmonella spp.Shigella spp.Neisseria spp.

(C)Pseudomonas spp 有抵抗性

「包裝」:

8~1000 瓶裝，盒裝。

SK&F 美商史克大藥廠公司
台北市民生東路三段156號8樓D室
技術合作
榮民製藥廠
中堀市中山東路3段447號
Askacef® 雅塞斯克蘭係美商史克大藥廠公司授權使用