YSP®

腦末梢循環障礙改善劑
Cerebral Vascular Disorder Agent

HDT-005
衛署藥製字第031053號
Code No.:38079

赫利健®
錠

（待赫果信）

HEADGEN®
Tablets

(Dihydroergotoxine mesylate)

3.98cm

【成　分　名】
Dihydroergotoxine mesylate

【劑型、含量】
錠劑：每錠含Dihydroergotoxine mesylate.....1.5mg

【賦　形　劑】
Microcrystalline Cellulose、Lactose、Sodium Starch Glycolate、Talc、Magnesium Stearate。

【臨 床 藥 理】
1. Dihydroergotoxine mesylate的作用機轉尚不清楚，可能爲在中樞減少血管緊張度及減少心跳並阻斷了週邊α接受體，另一可能機轉爲影響神經細胞代謝，進而改善了氧氣的攝取，及改善了腦部代謝而使抑制性神經傳導量正常。
2. 藥物動力學：
本品口服吸收率約百分之二十五，半小時至一小時半之後達到最高血漿濃度。由於首渡效應所致，生體可用率約在百分之五至十二之間。分佈體積爲1100公升，約16公升/公斤，百分之八十一與血漿蛋白結合。它的排除爲雙相式，α相的半衰期較短，爲1.5至2.5小時，β相半衰期較長，爲13-15小時。主要經由膽汁排入糞便中。經由尿液排除的量約百分之二，包括原形藥及其代謝產物，原形藥少於百分之一。總廓清率爲每分鐘約1800公撮。老年病人的血漿濃度略高於年輕人。由於僅有一部份的藥品及其代謝產物經由腎臟排除，因此腎功能不全的病人通常不需要減少劑量。

【適　應　症】
老人痴呆之輔助治療。

【用法・用量】
本藥須由醫師處方使用。
口服劑：每日服用3至6mg，分次服用，最好在飯前服用。

【注 意 事 項】
[禁忌]：已知對本藥過敏者。
[注意]：1. 在出現嚴重心動過緩時，須注意。
必須將Dihydroergotoxine mesylate置放於孩童拿不到的地方。
2. 低血壓、急發性精神疾患服用本品須衡量危險性與效力。
3. 過量處理：目前尚無因服用過量而產生嚴重症狀之病例。

【副　作　用】
偶爾會發生鼻塞、短暫性噁心以及胃部不舒服，但通常在用餐時服用即可避免。大多數病例，不須採行特別的措施，副作用即會自動消失。

【儲 存 條 件】
於25℃以下密閉容器避光儲存。

【包　　裝】
6～1000錠瓶裝、盒裝。

YUNGSHIN®
永信藥品工業股份有限公司
YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號
電　　話：（04）26875100
台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2151138