

# 達爾諾膠囊 200 毫克

## Danol Capsules 200 mg

### 【成份】：每膠囊含有：

Danazol……………200mg

### 【臨床藥理】：

1. Danazol 乃是藉著抑制腦下垂體釋放性腺激素 (gonadotropins) 而抑制腦下垂體-卵巢神經軸 (pituitary-ovarian axis) 的功能，研究確認此藥既不具動情激素 (estrogenic) 也不具有助孕素 (progestational) 作用，Danazol 可抑制濾泡激素 (F.S.H.) 及黃體化激素 (L.H.) 的釋放。具有輕微男性激素 (Gandro-genic) 作用則與給予的劑量有關。
2. 最近有證明指出 Danazol 可直接抑制性腺 (gonadal) 部位，且可和作用器官 (target organs) 的性腺類固醇 (gonadal steroids) 的受體結合，而產生抑制。
3. 在治療子宮內膜異位方面：Danazol 會改變正常及異位的子宮內膜組織使其失去活性而萎縮。Danazol 可使大部分發生子宮內膜損傷的病例完全消除，由於 Danazol 對腦下垂體-卵巢神經軸的抑制可改變陰道細胞及子宮頸粘膜。
4. 在治療纖維性囊腫性乳房疾病時：Danazol 通常可使結節部分或完全消除，且可使疼痛和觸痛完全消除，但可能會改變月經週期。一般而言，Danazol 對腦下垂體的抑制是可逆性的，當停止治療，排卵和月經會於 60 至 90 天內恢復正常。

### 【適應症】：

子宮內膜異位症、早發春機發動、囊狀慢性乳腺炎、乳腺肥大、乳痛、月經過多、纖維囊腫性乳房疾病。

### 【用法用量】：

1. 子宮內膜異位：  
中度到重度子宮內膜異位或是因而不能孕育者一開始劑量是 800mg 分兩次給藥。停經或急速疼痛之症狀亦可  
用此劑量給藥。輕度 -200 ~ 400mg 一天，分 2 次給藥。  
以上應從月經期間開始治療 3 ~ 6 個月不可中斷。視病況需要可再延長至 9 個月，結束治療後，若再發病可再  
重複同樣方法。
2. 纖維性囊腫性乳房疾病：  
100 ~ 400mg 一天，分 2 次給藥，亦應從月經期開始給藥。  
大部份病例第一個月乳痛、觸痛可明顯減輕，2 ~ 3 個月內即可消除，若從不間斷治療可在 4 ~ 6 個月內消  
除結節。  
本藥須由醫師處方使用。

### 【禁忌症】：

Danazol 不應給具有下列情況之患者：

1. 未經診斷之生殖器不正常出血者。
2. 肝、腎、心臟功能明顯受損者。
3. 孕婦。
4. 哺乳者。

### 【警告】：

1. 懷孕期間使用此藥的安全理論尚未建立，因此治療期間懷孕了，則需停藥，若繼續投與胎兒會有男性化現象，尤其女胎兒會明顯導致外生殖器陰蒂肥大和陰唇融合。

2. 治療纖維性囊腫性乳房疾病之前應先排除乳癌因素，所以治療期間若有結節存在，甚或變大就必須考慮是否為乳癌並詳細檢查。
3. 長期治療在 C17 位置上有煙基化 (Alkylation) 的類固醇，已被證明有膽汁鬱滯黃疸、肝紫斑等毒性產生，醫師應機警地用 Danazol 於長期治療。
4. 病人應謹慎注意男性化的現象。

**【副作用】：**

1. 男性化影響：痤瘡、水腫、輕微多毛症、乳房縮小、聲音低沉、皮膚頭髮油膩、體重增加、少數有陰蒂肥大或睪丸萎縮。
2. 低動情激素症：表現在臉部潮紅、流汗、陰道炎（包括癢、乾燥、灼熱及陰道出血）、神經緊張和情緒變化等。
3. 每日劑量超過 400mg 會有血清酶升高或黃疸等肝功能損害報告。

**【注意事項】：**

1. 投與本品前均需檢查有無懷孕。
2. 本品可能引起某種程度之體液滯留、癩癧、偏頭痛、心臟或腎功能不良須特別注意。
3. 治療期間需定期肝功能測試。
4. 青春期的患者每隔 3 ~ 4 個月須檢查精液體積、黏度、精蟲數及運動性能。

**【賦形劑】：**

Potato Starch(Dried), Sodium starch glycolate, Hydroxypropyl cellulose L (EQ to HPC-L), Lactose, Silicon dioxide AD-102, Magnesium stearate, No.2 Hard shell capsule 衛署藥製字第 012967 號  
(Gelatin, Sodium lauryl sulfate, Glycerol, New coccine, Sunset yellow FCF, Titanium dioxide)

**【儲藏】：**

貯存於 25℃，避光，緊密之容器內。

**【包裝】：**

2-1000 粒瓶、鋁箔盒裝。

G-1217  
衛署藥製字第 031280 號

## 健喬信元醫藥生技股份有限公司

藥商地址：303新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號  
製造廠名：健喬信元醫藥生技股份有限公司 健喬廠  
製造廠址：303新竹縣湖口鄉工業一路6號