

衛署藥製字第031526號
GMP · G-1336

"壽元" 利腦通 注射液200毫克(比拉西達) Lilonton Injection 200mg "S.Y" (Piracetam)

【含量】Each mL contains:

Piracetam.....200mg

賦形劑：Sodium Bisulfite, Water for Injection

【臨床藥理】

本品主要係作用於中樞神經系統，它能選擇性作用於大腦皮質，增加大腦對低氧症之抵抗力，並能改善各種大腦損傷或腦血管障礙等症狀。（依文獻資料：藥物代謝：30小時內由尿液排除，其中1-2%由糞便排出。半衰期為4—5小時；完全腎衰竭及可逆性腎衰竭之患者半衰期為48—50小時。可通過胎盤障礙。）

【適應症】

對腦血管障礙及老化所引起之智力障礙可能有效。

【注意事項】：

本藥限由醫師使用。

平均劑量為：以1gm計一次1安瓿，每天三次。靜脈、肌肉注射均可。在初期注射投藥時，每天可達到10gm或15gm，依病情的輕重而酌量使用。

小孩：按體重，每天30～50mg/公斤體重之間。

治療期間：除一些急性病例其效果幾乎即可顯見外，通常自第三星期後可看出進步，為了要使病情更好和增加其進步，必須依醫師指示繼續使用。

老人：根據其腎臟功能調整使用劑量。

【注意事項】

禁忌：嚴重腎臟機能不全者禁用。

【交互作用】

與warfarin併用時可能會有出血（月經）之症狀出現。

【副作用】

於治療初期可能會有精神運動性的精神激昂的症狀，但少見。其餘神經性症狀如頭痛、痙攣、暈眩、錐體外症狀及胃腸道症狀如噁心、嘔吐、厭食、下痢、便秘、及胃痛偶會發生。消化功能之改變亦曾發生。

【保存條件】

本品應置於單劑量熔封容器內，並貯存於陰涼處，25°C以下。

【包裝】

5、10、15、20毫升玻璃安瓿裝、100支以下盒裝。

壽元化學工業股份有限公司

嘉義市新民路128號