



糖質副腎皮質賀爾蒙

“國嘉” 倍嘉松錠0.6毫克(貝皮質醇)

Becasone Tablets 0.6mg “KOJAR” (Betamethasone)

本品Betamethasone口服後，迅速由胃腸道吸收，其與Prednisolone主要不同在16β接有methyl group可增加抗炎作用，在C-9接有Fluorine可減少鈉離子及水份的滯留。

【適應症】

急慢性副腎皮質機能不全，抗過敏及各種抗炎作用。

【用法用量】

每天0.6mg至7.2mg依病情酌量增減。

本藥須由醫師處方使用。

【成份】

Each Tablet Contains:

Betamethasone.....0.6mg

【賦形劑】

Lactose Powder、Sodium Starch Glycolate、Microcrystalline Cellulose 101、Povidone、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Glyceryl Monostearate、Microcrystalline Cellulose PH 102

【注意事項】

1. 誘發感染症，續發性副腎皮質機能不全、消化性潰瘍、糖尿病等的副作用出現時，投與時須注意下列事項：

- 投與時須特別注意其適應性及症狀，若其他療法效果良好時，應停止本品投與，改用其他療法。
- 連續服用法，若迅速停藥，會有發熱、頭痛、食慾不振、肌肉痛等現象，若予停藥，應徐徐減量仔細觀察之。

2. 禁忌：

- 對本品過敏患者。
- 消化性潰瘍患者。
- 白內障、綠內障患者。
- 高血壓、血栓患者。
- 電解質異常者及最近有動內臟手術者。

3. 慎重投與：

- 感染症患者：
- 糖尿病、胃多孔症、腎不全、甲狀腺機能低下、肝硬變、脂肪肝、脂肪塞栓症、重症肌無力等患者。

4. 副作用：

下列症狀出現時須仔細觀察，並作適當處理：

- 脂質、蛋白質代謝：月亮臉、野牛肩、脂肪肝。
- 體液、電解質：浮腫、低鉀性鹼中毒。
- 血液：白血球增多、血栓症。
- 皮膚：紫斑、異常發汗、脫毛。
- 過敏現象時應停藥。

5. 孕婦及授乳婦的投與：

- 本品動物實驗有催畸型的報告，孕婦及可能懷孕婦女應判斷其有益性大於危險時才投與。
- 本品會分泌至母乳中，授乳婦避免投與。

6. 小孩投與：

- 會抑制小孩發育。
- 長期服用會增加頭蓋內壓。

7. 相互作用：

- Barbiturates誘導體、phenytoin併用會促進代謝，減少本品作用。
- 本品會減弱抗凝血劑、口服降血糖劑的作用。
- 利尿劑(鉀保持性利尿劑除外)的併用，會引起低鉀血症。

【包裝】

2~1000粒塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

【儲存】

室溫避光保存(25°C)。



國嘉製藥工業股份有限公司 幼獅三廠
KOJAR PHARMA TAICHUNG YOUTH PLANT 3

臺中市大甲區日南里工十路2號
服務專線：(04)26816197