

末梢血管循環改善劑
“強生” 庇泰祿糖衣錠 100毫克
(配妥西菲林)

PENTAL S.C. TABLETS 100mg “JOHNSON”
(Pentoxifylline)

衛署藥製字第032053號(G-1533)

- 【成分名】 Pentoxifylline
- 【賦形劑】 Calcium Phosphate Dibasic Dihydrate、Carnauba Wax、Gelatin、HPMCP-55、Hydroxypropyl Cellulose L、Magnesium Stearate、PEP 101、Povidone K-30、Sodium Starch Glycolate、Starch、Sucrose、Talc、Titanium Dioxide
- 【劑型、含量】 糖衣錠：每錠含Pentoxifylline 100mg
- 【臨床藥理】 Pentoxifylline可促進末梢血液循環，作用複雜且尚未完全明瞭。口服吸收良好。吸收後很快經肝臟代謝(First-pass effect)成多種不同代謝物。主要由尿中排泄。
- 【適應症】 末梢血管循環障礙。
- 【用法、用量】 本藥須由醫師處方使用。
1. 通常成人劑量，一天3次，每次1~2錠，伴著些液體整粒吞服與食物共服。若病人有出現胃腸或中樞神經的副作用時，則其劑量應減量，如果其副作用仍然持續，則停止服用。
2. 雖然在治療2~4週後，即會出現療效，但仍須持續治療八週以上。
3. 有低血壓，血壓不穩的患者或腎功能不良者，須調整個別劑量。
- 【注意事項】 1. 腎功能不全之患者，Pentoxifylline廓清率降低，可能引發毒性，需減少劑量。
2. 對Pentoxifylline有敏感性的病人不可服用此劑。
3. 有視網膜出血或急性心肌梗塞及懷孕中的婦女不可服用本劑。
4. Pentoxifylline和其他代謝物會排泄於乳汁中。老鼠實驗中有引起腫瘤的可能，應依此藥對母親之重要性審慎評估。
FDA Pregnancy Category(懷孕用藥級數)：C
5. 18歲以下兒童安全性尚未建立。
6. 禁忌：對Pentoxifylline或Methylxanthines(如Caffeine、Theophylline、Theobromine)過敏者禁用。
- 【相互作用】 Pentoxifylline會延長Prothrombin time，增加出血機會。因此使用Warfarin的病人要時常監測PT。有出血傾向者要定期檢驗血液實驗值(包括血紅素、血比容)。
- 【副作用】 1. 一般症狀可能有噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈(碰到這些症狀，須作適量的劑量調整)。
2. 皮膚潮紅、心跳加快，胸氣塞或低血壓(這些副作用可能是因為高劑量的服用，須將劑量減低，作適量調節)。
3. 少數副作用例子有搔癢、蕁麻疹、血管神經性水腫(這些副作用作適量的劑量調節即可)。
4. 本藥中毒之症狀與劑量有關，通常出現於服用4~5小時後並持續12小時。症狀有潮紅、低血壓、緊張、興奮、顫抖、痙攣、嗜睡、意識喪失、發燒和激動。
治療：洗胃並使用活性炭。監測心電圖與血壓。除了症狀治療外，維持呼吸與血壓，治療心律不整並控制痙攣。
- 【儲存條件】 室溫下儲存。
- 【包裝】 12~1,000錠 塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。



Code No.:L-34

強生化學製藥廠股份有限公司

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO.,LTD.
新北市241三重區三和路四段77、79號
訂貨專線：(02)29894756 FAX：(02)29712579
工廠電話：(02)22878405