

# 疤膚力® 軟膏

SCARFREELY® Ointment

衛署藥製字第032341號 G.M.P. G-1694

本品係由特殊成分Acexamic Acid配合廣效殺菌劑Neomycin Sulfate及抑菌劑Sorbic Acid所製成，三者以適當含量配合協同發揮極佳抗感染及抗疤之特殊療效，經臨床使用證明，對皮膚創傷及頑固性潰瘍等症狀，確實有效。

**【成 分】**每gm含

Acexamic Acid.....	50mg
Neomycin(as Sulfate).....	4mg(Potency)
Sorbic Acid.....	4mg
Cream Base Wax No.80、Propylene Glycol、 Methyl Paraben、Propyl Paraben、Glyceryl Monostearate、 Lanoline Anhydrous、Isopropyl Myristate、Mint Flavor、Lilies E 402101、Purified Water	

**【藥理作用及特點】**

- 1.促使膠原纖維合成規律化，避免發炎的鄰近組織產生不正常的黏連，而造成肥腫或瘢瘤現象。
- 2.可促進患部產生優良性質的結締組織層，並適當調整細胞的生理活性利於上皮形成，加速傷口癒合及組織修復。
- 3.具有使傷口瘢痕柔軟作用，促進表皮外形之平整化，縮短結痂時間，並提供良好的結膜底層，便利皮膚移植。
- 4.具廣效殺菌效果，在皮膚上能發揮持久的保護功能，並預防重覆感染之危險性。

**【適 應 痘】**燙傷、疤痕、瘻管性骨炎、潰瘍性褥瘡及靜脈曲張，預防外傷及手術後傷口癒合後引起之皮膚萎縮及瘢瘤。

**【用法用量】**取適量塗布患部使用，使用前請先將傷口或潰瘍面加以消毒清潔，於塗布後以紗布包紮覆蓋，使用次數，視患部情況而定。

本藥須由醫師處方使用。

**【注意事項】**

- 1.下列患者請遵從醫師指示小心用藥：  
嚴重腎疾患、靜脈腫瘤、燙傷引起之水泡、正在流膿之傷口。
- 2.授乳婦不得塗於乳房，以免嬰兒吸食。
- 3.本品不適用於嬰兒皮膚更新及大片傷口上；且為避免抗藥性產生。治療期以一星期為佳。
- 4.對下列藥物有過敏往歷者，宜慎重使用：  
Streptomycin. Kanamycin. Neomycin. Gentamycin.
- 5.副作用：偶有發疹、搔癢、腫脹、小水泡等不適現象發生。

**【包 裝】**1000公克塑膠瓶裝、100公克以下鋁軟管裝。

PIC/S GMP藥廠



中美兄弟製藥股份有限公司

彰化市彰鹿路106號 諮詢專線:04-7524166

健康訊息請參閱網站 <http://www.健康之道.tw>