

# 金十字 胃乳液

## Keenstom Plus Suspension

衛署藥製字第032650號  
G.M.P G-1835  
LT-0286-KM

**【作用】：**

具有制酸及消脹作用，本品服用後，氫氧化鋁可發生胃酸中和作用，氫氧化鎂繼之發生作用，故對於胃酸有中和作用。

**【組成】：**每ml含

Aluminum Hydroxide gel.....40mg

Magnesium Hydroxide.....40mg

Simethicone.....4mg

單次劑量(10ml)之酸中和能力為29.10mEq，鎂含量為13.72mEq。

**【適應症】：**

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多，解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

**【用法用量】：**

一天3次，或需要時服用。成人每次10ml，12歲以上適用成人劑量；6歲以上未滿12歲，每次5ml；3歲以上未滿6歲，每次2.5ml；3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治。不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

**【警語】：**

一、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

(一)本藥每日最大建議劑量之乳糖含量超過5g，對於牛奶或乳製品耐受度低者應小心服用或請諮詢醫師藥師藥劑生。

(二)未滿3個月之嬰兒不得服用。

(三)一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。

(四)制酸劑不得併用其他藥品。

二、如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。

三、消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。

四、本藥含鋁之制酸成分可能會引起便秘，偶有噁心、嘔吐。

五、本藥含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。

**【注意事項】：**

腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。

**【賦形劑】**

Methylparaben, Propylparaben, Sorbitol, Saccharin, Peppermint Oil, Strawberry Essence, Xanthan Gum

**【包裝】**

60-4,000毫升塑膠瓶裝，6-400包(每包10毫升)鋁箔袋裝、盒裝。



優生製藥廠股份有限公司  
台中市南屯區工業區21路14號

MM 201511