



# “國嘉” 安布索錠 30毫克

## Ambroxol Tablets 30mg “KOJAR”

### 【作用】

1. 調節漿液性及粘液性分泌：本品在氣管及支氣管，調節粘液性分泌，使它的粘性及彈性正常化。如此，不但使粘液易為纖毛運動所輸送，更使粘液不再阻塞漿液性分泌的出口，漿液性分泌因之增加，溶膠深層度恢復正常，因而恢復纖毛的活動空間及物理支持，進而使粘液纖毛運送的動力系統恢復正常運動，從而使痰液能容易的排出。
2. 刺激界面活性劑的形成及分泌：本品刺激肺泡第二形細胞不斷分泌界面活性劑，除了降低肺泡的表面張力，使其安定之外，在氣管中，界面活性劑能降低粘液間粘著力，使粘液不致聚合成大塊而不利於運送。另外又能降低粘液與上皮細胞之間的粘著力，界面活性劑減低粘液之粘著力，亦有助於咳嗽機轉將痰液咳出。

### 【適應症】

祛痰。

### 【用法用量】

- 成人或6歲以上兒童：治療初期，一天3次，每次30mg。  
長期治療時，劑量可減低為1天2次，1次30mg。  
5歲以下孩童：按體重1天1.2~1.6mg/kg，分2~3次服用。  
本藥須由醫師處方使用。

### 【成分】

Each Tablet Contains :  
Ambroxol Hydrochloride.....30mg

### 【賦形劑】

Hydroxypropyl Cellulose L、Lactose Powder、Microcrystalline Cellulose 101、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Tartrazine Yellow No.4 Lake

### 【副作用】

1. 胃部膨脹感、胃痛、下痢、軟便、噁心、嘔吐、食慾不振。
2. 蕁麻疹樣紅斑、瘙癢感等過敏症。

### 【注意事項】

1. 孕婦及授乳婦女應確定其治療的有益性大於危險性時才給予服用。
2. 本品應遮光、室溫保存。
3. 有極少數的報告指出，發生如：多形性紅斑(erythema multiforme)、史蒂文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症(Stevens Johnson Syndrome<SJS>/toxic epidermal necrolysis<TEN>)、急性廣泛性發疹性膿胞症(acute generalised exanthematous pustulosis<AGEP>)等嚴重皮膚損害，與使用祛痰劑，如含Ambroxol或Bromhexine成分藥品有時間關聯性，但這些案例通常與患者的潛在疾病及/或併用藥物有關。此外，在該等嚴重皮膚不良反應的早期階段，患者可能先出現類似流感的非專一性前兆症狀(如：發燒、身體感覺疼痛、鼻炎、咳嗽及喉嚨痛)。若受這些類似流感之非專一性前兆症狀的誤導，一開始可能會使用咳嗽及感冒藥來作症狀治療。因此，如果皮膚或黏膜出現新的傷口，須立刻尋求醫療諮詢並停藥。

### 【不良反應】

1. 免疫系統疾患：  
罕見：過敏反應(hypersensitivity reactions)  
頻率未知：過敏性反應(anaphylactic reactions)(包括：過敏性休克、血管性水腫、瘙癢症)
2. 皮膚及皮下組織疾患：  
罕見：皮疹、蕁麻疹  
頻率未知：嚴重皮膚不良反應(包括：多形性紅斑、史蒂文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症、急性廣泛性發疹性膿胞症)

### 【包裝】

6-1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

### 【儲藏】

本品應包裝於緊密容器，儲於室溫避光(25℃)且孩童不易取得處所。



國嘉製藥工業股份有限公司 幼獅三廠  
KOJAR PHARMA TAICHUNG YOUTH PLANT 3

臺中市大甲區日南里工十路2號  
服務專線：(04)26816197