

胃粘膜局部麻醉劑 “羅得” 舒樂胃 錠

Suloweilin Tablets "ROOT"

衛署藥製字第033023號

成份：每錠中盒：

Oxethazaine.....5mg
Aluminum Magnesium Silicate.....244mg

賦形劑：Lactose、Tartrazine、Sunset Yellow FCF、Magnesium Stearate、
Carmellose Sodium、Potato Starch、Avicel 102、Povidone K-30

作用：

本品所含之Oxethazaine為局部麻醉劑，但其毒性較一般之局部麻醉劑低，並且抑制胃酸分泌及抑制胃腸蠕動之作用，另含Aluminum Magnesium Silicate，故本品為一胃部疾患治療劑。

本劑服用後崩散而發揮效果，本劑主成分Oxethazaine係表面麻醉劑，在pH4以下之酸性溶液溶解而產生作用，可以解除胃痛，且可抑制過剩之酸，抑制胃運動機能亢進對平滑肌具有抗痙攣作用。

適應症：

急性腸炎，食道炎及刺激性大腸炎所引起之噁心、嘔吐、胃痛、腹痛。

用法用量：

通常成人一次二錠，兒童一錠，1日3-4次，飯前及就寢前十五分鐘服用。
本劑須由醫師處方使用。

注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
5. 腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加強透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)，透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。

警語：

- (一) 除非有醫師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 1. 對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過5g(每錠之乳糖含量約0.07g)。
 2. 未滿3個月之嬰兒不得服用。
 3. 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
 4. 制酸劑不得併用其他藥品。
- (二) 如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
- (三) 消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
- (四) 本藥含鋁之制酸成分可能會引起便秘，偶有噁心、嘔吐。
- (五) 本藥含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。(每錠之鎂含量約2mEq)
- (六) 有些病人可能對Oxethazaine過敏，偶有過敏現象。過敏症狀如：
皮膚發疹、搔癢症、舌炎、血管水腫。
- (七) Oxethazaine服用過量，有些病人可能有眩暈昏厥，嗜睡的情形。
- (八) 本品含Oxethazaine，只建議在成人使用，孕婦，授乳婦及未滿12歲小孩不建議使用。

儲存：30°C以下儲存。

包裝：12-1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

羅得化學製藥股份有限公司

台中市大甲區東西七路一段65號