"黃氏"

20毫克（匹若卡）

普濕康錠

Piroxicam Tablets 20mg "H.S."



PIC/S GMP藥廠

黃氏製藥股份有限公司

雲林縣斗南鎮大同路444巷11號

衛署藥製字第033079號

GMP G-2021

Lot No.

Exp. Date:

原發性痛經

Tabs.

【成分】

Each Tablet Contains : Piroxicam.....20mg

【適應症】

類風濕性關節炎、骨關節炎(關節痛、退化性關節炎)、僵直性脊椎炎、急性肌肉骨骼損傷、急性痛風、原發性痛經。

【用法用量】

類風濕性關節炎、骨關節炎(關節痛、退化性關節炎)僵直性脊椎炎：
推薦初劑量每天20毫克一次使用。大多數的病人將維持每天20毫克的劑量，少數人則維持10毫克的劑量即可；但也有些人每天需要30毫克的劑量，分一次或數次服用。長期服用每天30毫克以上的劑量會增加胃腸副作用發生的可能性。

急性肌肉骨骼損傷：
最初兩天，每天劑量40毫克分一次或數次服用，然後降到20毫克的日劑量，治療7到14天。

急性痛風：
開始治療以40毫克一次口服，接著4到6天每天40毫克分一次或數次服用。普濕康不適於痛風長期治療。

手術後和外傷後疼痛：
推薦初劑量每天20毫克一次口服，如果期望達到更好的止痛效果，則在最初兩天，每天40毫克分一次或數次服用，但未來的治療劑量必須降到每天20毫克。

原發性痛經：
在疼痛症狀開始時以每天 2 錠劑量一次口服，連續治療2天，接著需要的話，再以每天 1 錠劑量一次口服，服用1~3天。

本藥須由醫師處方使用

注意事項、副作用、警語：請詳閱說明書後服用。

T-15