


“黃氏”

# 普濕康 錠20毫克(匹若卡) Piroxicam Tablets 20mg "H.S."



## 【作用】

普濕康是非類固醇抗炎劑，具有止痛作用。此藥可抑制實驗動物的水腫、紅斑、組織增生，及疼痛等現象。無論發炎原因何為，此藥均有效用，雖然它的作用方式尚不十分清楚，一些體外和體內的研究顯示普濕康在免疫或炎症反應中具有下列作用：

經由抑制cyclooxygenase酶素而抑制prostanoid（包括前列腺素）的合成已確立普濕康的作用，不是經由腦下垂體—腎上腺軸之刺激作用。研究顯示對軟骨代謝並無任何副作用。

臨床研究顯示普濕康對各種原因引起之疼痛，例如外傷、生產手術、外科手術後之疼痛有迅速止痛的效果。

普濕康是前列腺素合成的強力抑制劑，它已被證明能降低子宮的過度收縮而有效的治療經痛。

普濕康在口服後能很順利的被吸收，禁食狀態並不影響吸收的程度和速率。人體中的血漿半衰期大約是50個小時，而每天服用一次即可維持穩定的血清濃度，以每天20毫克連續治療一年仍能產生初期所達穩定狀態的血中濃度。普濕康代謝得很完全，每天的劑量不到5%以原型排於尿和糞。

有一重要代謝途徑是普濕康側鏈pyridyl環經化，然後再和己四醇醚結合，由尿中排出。

【成份】 Each tablet contains:

Piroxicam.....20mg

## 【賦形劑】

Lactose、Starch Corn、PVP K-30、Talc、Tartrazine、  
Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate.

【適應症】 類風濕性關節炎、骨關節炎（關節痛、退化性關節炎）僵直性脊椎炎、急性肌肉骨骼損傷、急性痛風、原發性痛經。

## 【用法用量】

類風濕性關節炎、骨關節炎（關節痛、退化性關節炎）僵直性脊椎炎：

推薦初劑量每天20毫克一次使用。大多數的病人將維持每天20毫克的劑量，少數人則維持10毫克的劑量即可；但也有些人每天需要30毫克的劑量，分一次或數次服用。長期服用每天30毫克以上的劑量會增加胃腸副作用發生的可能性。

急性肌肉骨骼損傷：

最初兩天，每天劑量40毫克一次或數次服用，然後降到20毫克的日劑量，治療7到14天。

急性痛風：

開始治療以40毫克分一次口服，接著4到6天每天40毫克分一次或數次服用。普濕康不適於痛風長期治療。

手術後和外傷後疼痛：

推薦初劑量每天20毫克一次口服，如果期望達到更快的止痛效果，則在最初兩天，每天40毫克分一次或數次服用，但未來的治療劑量必須降到每天20毫克。

原發性痛經：

在疼痛症狀開始時以每天二錠劑量一次口服，連續治療2天，接著需要的話再以每天一錠劑量，一次口服，服用1~3天。

本藥須由醫師處方使用。

## 【注意事項】

服用此藥偶而會引起消化性潰瘍或胃腸出血，少有致命的病例。有上胃腸道病史的人使用普濕康須注意。

極少數的病例，非類固醇抗炎劑可能引起組織間隙腎炎，腎絲球腎炎、腎乳頭壞死或腎綜合病症。非類固醇抗炎劑會抑制腎臟前列腺素的合成，而此前列腺素對腎血流和血量減少病人之腎灌注的維持，扮演一個支柱的角色。在這些病人如服用非類固醇抗炎劑可能會明顯的促進腎臟代償不全，不過如停止非類固醇抗炎劑之治療則腎臟可以回復到治療前的狀態。這樣的反應對帶有鬱血性心臟衰竭、肝硬化、腎綜合病症或明顯腎病的病人較具危險性。因為普濕康和它的代謝產物（低於5%的日劑量以原型排泄）廣泛由腎臟排泄，因此對腎機能有缺損的病人，應使用較低的劑量，同時小心監視這些病人的狀況。

非類固醇抗炎劑可能引起鈉、鉀、和液體的滯留而干擾利尿劑的促進鈉尿作用，在治療病人伴有心機能受損或高血壓者，必須牢記這些性質，因為非類固醇抗炎劑可能使他們更加惡化。

以coumarin型抗凝劑治療的病人，同時服用普濕康和其他的非類固醇抗炎劑，曾有極少數的出血病例報告。

普濕康如同其他非類固醇抗炎劑，會減少血小板的凝聚作用而延長出血時間，所以測定出血時間應特別注意。

一般並不推薦普濕康和乙醯水楊酸或其他的非類固醇抗炎劑併用，因為並無充分資料證明這種複方要比單獨使用普濕康來得更有效，反而容易增加副作用的潛在威脅。

因為曾有使用非類固醇抗炎劑而引起眼睛方面的副作用報告因此服用普濕康若有視覺上的不適，應作眼球的檢查。

普濕康極易與蛋白質結合而取代其他與蛋白質結合一起的藥物，所以病人在使用這些藥物又同時服用普濕康時，醫師必須小心監視並調整這些藥物的使用劑量。非類固醇抗炎劑，包括普濕康已被報告會增加血清鉀的濃度，因此建議在使用及停用普濕康時應測定鉀的濃度。

對人體的研究，顯示同時服用普濕康和乙醯水楊酸會降低普濕康血中濃度至正常值的80%，但與制酸劑併服則不受影響。當普濕康與digoxin或digitoxin併服治療時，彼此都不會影響個別的血中濃度。

## 【禁忌】

1.曾對此藥過敏之患者，不能再使用。

2.活性消化性潰瘍。

3.從前對此藥過敏的患者，不能再使用，對阿斯匹靈和其他非類固醇抗炎劑敏感之患者須注意使用。

4.普濕康不可用於對使用阿斯匹靈和非類固醇抗炎劑會產生氣喘、鼻炎、血管水腫或尋麻疹之患者。

## 【警告】

a.對孕婦：雖然動物實驗並未顯示此藥有催產作用，但孕婦及授乳婦人使用此藥是否安全，尚未確定。本藥作用於前列腺素合成酶（Prostaglandin Synthetase），會抑制前列腺素之合成及分泌。其他非類固醇抗炎劑亦具此種作用，已知此作用與服用此類藥品的懷孕動物之難產及延遲分娩有關。

b.兒童：兒童在何種情況下可服用此藥及其劑量如何等問題均尚未確定。

## 【注意】

a.服用此藥可能會引起消化性潰瘍或胃腸出血。故有胃腸病之患者，服用此藥時須特別注意。

b.少數病人於服用非類固醇抗炎劑（包括本藥）期間，會有血中尿素氮增加之現象。惟此種增加之現象，會止於一定之限度，且停藥後便會恢復正常，又血中尿素氮之增加與血清肌酸酐之增加無關。

## 【不良反應】

常見之副作用除胃腸方面以外，少數病人會出現水腫，尤其是踝部水腫，一般常規檢眼鏡檢查及陰燈檢查，皆未發現病人之眼睛有任何變化，又有些人會發生與胃腸出血無關之血紅素或血球容積減少。亦有人曾經發生肝機能之變化。大多數非類固醇抗炎劑包括本藥，皆會使部分病人之血清轉胺基酶量（SGPT）增加。

【過量】 服用過量時，可對病人採取支持及對症療法。

【包裝】 4-1000錠塑膠瓶裝，鋁箔盒裝，錫箔盒裝。