

GMP 優良藥品

衛署藥製字第033098號

# “聯邦”喜潰治錠 400公絲

## Ciketin Tablets 400mg "Union"

本品是醫藥界新發明的消化道潰瘍治療劑，屬於組織胺-H<sub>2</sub> receptor 的拮抗劑，即直接阻隔組織胺在胃壁細胞上之-H<sub>2</sub> receptor 的作用，故它不僅可抑制基本的胃酸分泌，亦可有效的抑制各種刺激（例組織胺、胃泌素、迷走神經、胰島素、食物、咖啡鹼等）所引起的胃酸分泌，能減低胃蛋白酶分泌量，及增進胃腸粘膜的抵抗力，臨床上證實，本品對急性糜爛性胃炎所致的上胃腸道出血，甚具療效。

〔成 分〕：每錠含：

Cimetidine ..... 400mg.

〔適 應 症〕：

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、Zollinger-Ellison 症候羣、逆流性食道炎、上部消化管出血（消化性潰瘍、急性壓迫潰瘍、出血性胃炎）、急性胃炎、慢性胃炎的急性增惡期所引起胃粘膜病變改善。

〔用法用量〕：本藥須由醫師處方使用。

成人一口服：

79.11.30

(1)十二指腸潰瘍：

早、午、晚三餐時各服用 200mg，睡前服用 400mg，治療期 4 ~ 6 週。

(2)胃潰瘍：

早、午、晚三餐時各服用 200mg，睡前服用 400mg，治療期 6 週。

(3)預防潰瘍復發：

每日睡前服用 400mg 或早晚各服用 400mg，對曾有潰瘍復發之患者，於潰瘍癒合後，應繼續以低劑量治療 6 個月。

(4)消化性食道炎：

每日 4 次，每次 400mg，餐時及睡前服用，連續 4 ~ 8 週。

(5)Zollinger-Ellison 症候羣，及其他胃酸分泌過高的患者：

通常每日二次，每次 200mg，餐時服用及睡前服用。

〔注意事項〕：

- 腎機能不全的患者 (Creatinine clearance 低於 30ml/min.)，劑量需減低，在 Anephric 患者，(或 Creatine clearance 低於 15ml./min.)，一天 400 公絲，分兩次服用，循環中 Cimetidine level 會被血液滲析所降低，因此本品須於滲析最後階段才服用。
- 對惡性胃潰瘍患者，應避免使用本品治療，因本品會減輕惡性胃潰瘍之症狀，如此會延誤診斷治療。
- 使用 Warfarin 型的抗凝劑的患者，具隨著服用本品會發現 Prothrombin time 更延長，故當此兩種藥物同時服用時，抗凝劑的劑量須減低。
- 本品於動物試驗中可通過胎盤，及分泌於乳汁中，故除非必要，否則在懷孕期及分泌乳汁期最好不要使用本品。

〔副 作 用〕：

- 在本品治療期間，有少數患者有暫時的下痢、疲倦、暈眩、發疹現象的報告。
- 少數男性患者有輕微的乳房增殖現象，在繼續服藥期間，此症狀可能不變或恢復正常。
- 少數腎機能不全或腦綜合病症的老年人或重症患者，有輕微精神混亂的現象發生，於停藥後 24 小時內恢復正常。
- Plasma creatinine 少量增加，此現象不會因繼續服用而增加，治療結束後此種症狀會消失。
- 血中 Transaminase 增加，少數呈現間質性腎炎，停藥後症狀會消失。

〔過 量 時〕：

本品使用過量時，誘導嘔吐或灌洗法，常被用於症狀治療或支持療法。高劑量動物試驗顯示人工呼吸亦有助益，同時心跳過速亦可以  $\beta$ -blocking agent 控制。

〔包 裝〕：

100錠，500錠，1000錠 瓶裝 100錠 鋁箔盒裝



聯邦化學製藥股份有限公司

台北縣蘆洲鄉中正路59巷21號

