"元宙" 血循暢 錠(配妥西菲林)100毫克

Sephylline Tablets 100 mg (Pentoxifylline)

衛署藥製字第 033201 號
GMP G-2053

【成　份】Each tablet contains
Pentoxifylline.....100 mg

【臨床藥理】Pentoxifylline可促進末梢血液循環，作用複雜且尚未完全明瞭。口服吸收良好。吸收後很快經肝臟代謝(first-pass effect)成多種不同代謝物。主要由尿中排泄。

【適 應 症】末梢血管循環障礙。

【用法用量】本藥須由醫師處方使用
1.通常成人劑量，一天3次，每次100~400 mg，伴著些液體整錠吞服與食物共服。若病人有出現胃腸或中樞神經的副作用時，則其劑量應減量，如果其副作用仍然持續，則停止服用。
2.雖然在治療2-4週後，即會出現療效，但仍須持續治療八週以上。
3.有低血壓，血壓不穩的患者或腎功能不良者，須調整個別劑量。

【注意事項】1.腎功能不全之患者，Pentoxifylline廓清率降低，可能引起毒性，需減少劑量。
2.對Pentoxifylline有敏感性的病人不可服用此劑。
3.有視網膜出血或急性心肌梗塞及懷孕中的婦女不可服用本劑。
4.Pentoxifylline和其它代謝物會排泄於乳汁中。老鼠實驗中有引起腫瘤的可能，應依此藥對母親之重要性審慎評估。FDA Pregnancy Category(懷孕用藥級數)：C
5.18歲以下兒童安全性尚未建立。
6.禁忌：對Pentoxifylline或Methylxanthines (如Caffeine、Theophylline、Theobromine)過敏者禁用。

【相互作用】Pentoxifylline會延長Prothrombin time，增加出血機會。因此使用Warfarin的病人要時常監測PT。有出血傾向者要定期檢驗血液實驗值(包括血紅素、血比容)。

【副 作 用】1.一般症狀可能有噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈(碰到這些症狀，須作適量的劑量調整)。
2.皮膚潮紅、心跳加快，胸氣塞或低血壓(這些副作用可能是因為高劑量的服用，須將劑量減低，作適量調節)。
3.少數副作用例子有搔癢、蕁麻疹、血管神經性水腫(這些副作用作適量的劑量調節即可)。
4.本藥中毒之症狀與劑量有關，通常出現於服用4-5小時後並持續12小時。症狀有潮紅、低血壓、緊張、興奮、顫抖、痙攣、嗜睡、意識喪失、發燒和激動。
治療：洗胃並使用活性碳。監測心電圖與血壓。除了症狀治療外，維持呼吸與血壓，治療心律不整並控制痙攣。

【賦 形 劑】Starch、Lactose monohydrate、Povidone K-90、Sodium starch glycolate (Primojel)、Magnesium stearate、Tartrazine aluminum lake。

【儲存條件】於25℃以下儲存。

【包　裝】6~1000錠/塑膠瓶裝。

元宙化學製藥股份有限公司
YUAN CHOU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD
南投市南崗工業區南崗三路272號
TEL：(049)2253190