"正和" 賜安感冒液 (薑口味)

SYHANGANMU SOLUTION "C.H."

【成分】Each ml Contains：

有效成分及含量：

Acetaminophen……..……12 mg	**Caffeine Anhydrous……..…1.875 mg**
Chlorpheniramine Maleate.…0.1125 mg	**Guaiacol Glyceryl Ether…..…3.75 mg**

其他成分(賦形劑)：

Sodium Dehydroacetate……..…0.5 mg	Caramel……..…1 mg
Sucrose……300 mg	Menthol……..…0.05 mg
Alcohol 95%……..1.03 mg	Methylparaben……..…0.125 mg
Propylparaben……..0.125 mg	D-Sorbitol Solution……55 mg
Trisodium Glycyrrhizinate……...0.5 mg	Sodium Citrate……12.5 mg
Citric Acid……0.5 mg	Cinnamic Aldehyde……..…0.1 mg
Ginger Essence……..……..…0.025 mg	Purified Water added to……1 ml

【用途(適應症)】感冒諸症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、喀痰、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛)。

【使用上注意事項】

●有下列情形者，請勿使用：

1.曾因本藥成分引起過敏的人。

●有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1. 12 歲以下。

2.有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。

3.吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。

4.有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。

5.有心臟病及 65 歲以上的人。

●有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1.孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

2.正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。

3.同時服用含 Acetaminophen 成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

4.服用鎮靜藥或安眠藥的人。

●其他使用上注意事項：

1.為防止兒童誤食請妥善保管。

2.避免陽光直射。

3.勿超過建議使用量。

4.使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。

5.不要服用本藥超過七日。

6.服用過量的 Acetaminophen 可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 Acetaminophen 成分的藥品，但是每天服用 Acetaminophen 超過 4,000 毫克(mg)會發生肝臟損害。

7.酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為 Acetaminophen (Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。

8.可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

9.避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

年齡	通常一次量
11-15 歲	6ml
8-11 歲	5ml
5-8 歲	3ml
成人	10ml

一日三回，飯後或必要時就寢前服用一次。

【警語】

●服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

●服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1.若有任何不適情況產生。

2.咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。

3.症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。

4.喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。

5.服用過量〔每日超過 Acetaminophen 4,000 毫克(mg)〕，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。

6.有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】60-4000ml 玻璃瓶裝、塑膠瓶裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存】儲存於 25℃以下，避光存放。

衛署藥製字第 033257 號

PIC/S GMP
正和製藥股份有限公司新營廠
台南市新營區新工路 23 號(新營工業區)