“瑞安”癒咳錠 5毫克 15毫克

(氫溴酸右旋美索芬)

"Purzer" Mephan Tablet 5mg 15mg

(Dextromethorphan Hydrobromide)

瑞安大藥廠股份有限公司 PURZER PHARMACEUTICAL CO., LTD.

PIC/S GMP 衛署藥製字第033542 033543號 GMP優良藥品 G-2169 2170號

醫師藥師藥劑生指示藥品

本劑爲直接作用於咳嗽中樞之鎮咳劑。

【成　分】

每錠含:Dextromethorohan Hydrobromide ..... 5 15 mg

賦形劑:

Lactose Monohydrate, Dibasic Calcium Phosphate Dihydrate, Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Talc

【適 應 症】

鎮咳。

【用法用量】

"瑞安" 癒咳錠5毫克(氫溴酸右旋美索芬)

一天3次。成人1次4錠，12歲以上適用成人劑量；6歲以上未滿12歲，1次2錠；3歲以上未滿6歲，1次1錠；3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治。

"瑞安" 癒咳錠15毫克(氫溴酸右旋美索芬)

一天3-4次。成人1次1錠，12歲以上適用成人劑量；6歲以上未滿12歲，1次1/2錠；3歲以上未滿6歲，1次1/4錠；3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治。

【注意事項】

1.為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。

2.避免陽光直接照射，宜保存於陰涼之處。

3.除非醫師藥師或藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

4.勿超過建議劑量。

5.服藥後若有不適情況發生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。

6.本藥不得與含酒精飲料併服。

【副作用】

少數有思睡、頭暈、刺激等副作用。

【警語】

1.吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾患（包括如慢性支氣管炎、肺氣腫）所引起之咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽病人請勿自行使用。

2.有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。

3.除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

(1)3歲以下，請洽醫師診治。

(2)曾經因本藥物引起過敏症狀者不得使用。

【儲存條件】

本品應貯存於25℃以下處所。

【包裝種類】

24~1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝(5 mg)。

6~1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝(15 mg)。

瑞安大藥廠股份有限公司
地　址：台北市松山區光復南路1號12樓之2
製造廠：瑞安大藥廠股份有限公司觀音廠
廠　址：桃園市觀音區草漯里大同一路26號
服務電話：(02)2766-0887