

103x180mm

● 抗 Histamine 劑 ●  
“大豐” 力妃士他明 注射液  
30毫克/毫升 (鹽酸二苯安明)  
**RE-HISTAMIN INJECTION**  
30mg/ml "T.F." (Diphenhydramine)

【成分】每ml中含有：  
Diphenhydramine Hydrochloride.....30mg



【賦形劑】  
Benzyl Alcohol、Sodium Chloride and Water for Injection

【性狀】  
力妃士他明鹽酸鹽為熔點166~170度之白色柱狀結晶具特異之臭氣與苦味，不溶於無水苯及無水乙醚，溶於乙醇及三氯甲烷及水等，點於光線，空氣較為安定。

【適應症】  
氣喘、蕁麻疹、藥物疹、濕疹、過敏性皮膚炎。

【用法用量】  
通常一次30mg慢慢注射於皮下或肌肉內；輕症一次注射10mg，頑固之症狀注射50~100mg。

1. 早產兒 (premature infants) 及新生兒 (neonate) 不建議使用。
  2. 老人宜以最低有效起始劑量開始治療。
  3. 腎功能不全者應延長給藥間隔 (interval)：輕度 (GFR > 50 mL/min)：間隔6小時；中度 (GFR 10-50 mL/min)：間隔6-12小時；重度 (GFR < 10 mL/min)：間隔12-18小時。
  4. 本品不得供靜脈注射使用。
- 本藥限由醫師使用。

【注意事項】

1. 禁忌：
  - (1) 青光眼患者。
  - (2) 前列腺肥大等下部尿路閉塞性疾患患者。
  - (3) 妊婦、授乳婦、早產兒、新生兒。
2. 副作用：
  - (1) 過敏症：發疹等過敏症狀出現須停藥。
  - (2) 循環器：動悸。
  - (3) 精神神經系：倦怠感、神經過敏、頭痛、眠氣。
  - (4) 消化器：口渴、噁心、嘔吐、下痢。
3. 相互作用：中樞神經抑制劑，MAO 阻害劑會增強抗組織胺之抗膽鹼作用。
4. 本劑投與中患者不宜開車或操作機械。

【儲存溫度】  
25°C 以下室溫儲存

【包裝】1毫升玻璃安瓿裝，100支以下盒裝  
衛署藥製字第033566號

 **大豐製藥股份有限公司**  
公司·工廠：彰化市延平里岸頭巷11號