103x180mm

"大豐" 滴惠琳 注射液

150毫克/毫升（待普菲林）

DIPHYLLIN-M INJECTION

150mg / ml "T.F." (Diprophylline)

【成　　分】每ml中含有：

Diprophylline 150mg

【賦形劑】

Calcium Chloride, Water for Injection.

【特　　徵】

1.作用迅速而具有解除呼吸困難及利尿作用等他種製劑的所有之特徵，故被廣範應用於心臟及血管系疾患而發揮宏效。

2.氣喘及氣管支氣喘均可使用本劑，又對老人性的夜間咳嗽頻能奏效。

3.本劑因系中性水溶液，故肌肉注射亦不疼痛且可與他劑併用，又因副作用少故可連用。

【適 應 症】

氣喘及支氣管痙攣。

【用法用量】

成人通常1日1～2安瓿（0.3～0.6g）注射於靜脈或肌肉內，但因無蓄積作用，故可視症狀及年齡大幅增減其用量，並可連用，其發效時間並非即效性，但普通經過10～20分鐘即發效，且持續時間亦不短。本藥限由醫師使用。

【注意事項】

1.禁忌：對黃嘌呤化合物過敏者。

2.副作用：

(1)精神、神經系：偶有頭痛、不眠現象。

(2)循環器：偶有心悸高進。

(3)消化器：偶有噁心、嘔吐、食慾不振、腹痛、下痢。

(4)過敏症：偶有皮疹、搔癢等。

(5)靜脈注射會引起局部疼痛。

3.相互作用：

本品與其他黃嘌呤系藥物或中樞神經興奮藥併用，會引起過度的中樞神經刺激作用。

【包　　裝】2ml×100Amp。

衛署藥製字第033569號

GMP藥廠

大豐製藥股份有限公司

公司・工廠：彰化市延平里岸頭巷11號