〝大豐〞胃得倍朗 注射液

5毫克/毫升（美托拉麥）

METOPERAN INJECTION

5mg/ml 〝T.F.〞(Metoclopramide)

【警　　語】

1.使用含metoclopramide成分藥品可能造成遲發性運動障礙(tardive dyskinesia)此為出現於臉部、舌頭及四肢非自主性的運動障礙，具有潛在的不可逆性與嚴重性。遲發性運動障礙發生之風險與使用本品治療期間與總累積劑量(total cumulative dose)有正相關性，且分析本品之使用型態，約20%病人使用超過12周，故不建議長期(超過12週)使用本品治療，除非個案是經過評估，其治療效益高於發生tardive dyskinesia之風險者。

2.投與新生兒時應特別小心，因新生兒的清除時間較長，可能會造成血中濃度過高。且成人安全性資料不能外推至新生兒族群，使用metoclopramide藥品相關的不良反應如肌張力失調(dystonias)及錐體外路徑反應(extrapyramidal reactions)，於小兒族群比起成人更容易發生。

【作　　用】

作用於腦幹，調整消化系機能。

(1)增進胃蠕動的幅度與頻率。
(2)消除胃及幽門的痙攣。
(3)消除胃壅滯。
(4)十二指腸蠕動正常化。
(5)加速小腸的推進蠕動。

【成　　分】每ml中含有：

Metoclopramide Dihydrochloride Monohydrate.....5mg

【賦 形 劑】

Edetate Disodium, Citric Acid Anhydrous, Sodium Chloride, Benzyl Alcohol, Water for Injection.

【適 應 症】

預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。

【用法用量】

小兒一回2.5~5.0mg，一日2~3回依年齡增減。
成人一回10~20mg，一日2～3回。
飯前肌肉或靜脈注射，用於止吐時可酌情增量。
本藥限由醫師使用。

【注意事項】

1.副 作 用：

(1)內分泌：間腦之內分泌機能調節異常。
(2)消化器：胃之緊張增加，腹痛、下痢、便秘。
(3)精神神經系：頭痛、頭重、興奮、不安。
(4)循環器：血壓下降、頻脈、不整脈。

2.交互作用：

(1)抗膽鹼激性劑（如Atropine）與麻醉性止痛劑會拮抗 Metoclopramide在胃腸活動的作用。
(2)Metoclopramide與影響心志的藥物(如Phenothiazines)併用會增加錐體外路症狀。

【包　　裝】2毫升玻璃安瓿裝，100支以下盒裝。

【儲存條件】室溫儲存(15~30°C)。

衛署藥製字第033594號

大豐製藥股份有限公司
公司・工廠：彰化市延平里岸頭巷11號