“正和”耐適胃錠

Nice Well Tablets“C.H.”

本劑之 Activated Dimethicone 為具有排除泡沫氣泡之特性，而氫氧化鋁、氫氧化鎂配合，中和胃酸，為具有制酸、消脹之功效。

【成分】：Each Tablet Contains：

Activated Dimethicone.....25mg

Aluminum Hydroxide-Magnesium Carbonate Co-Dride Gel.....275mg

Magnesium Hydroxide.....100mg

【作用】：

1.活性 Dimethicone：能降低液面之表面張力，有消泡力，在生化學是屬於不活性化合物，能匯集腸內小氣泡，而產生排氣作用，驅除腸內氣泡。

2.氫氧化鋁、氫氧化鎂複合乾凝膠：為緩衝性制酸劑具有中和胃酸之作用。

3.單次劑量(2 錠)之酸中和能力為 20.0mEq，鎂含量為 8.93mEq。

【適應症】：緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多，解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

【用法用量】：一天服用 3 至 4 次，或需要時服用。應嚼碎後吞服。成人每次 2 錠，12 歲以上適用成人劑量，6 歲以上未滿 12 歲，每次 1 錠；3 歲以上未滿 6 歲，每次 1/2 錠；3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】：

1.為防止兒童誤食請妥善保管。

2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

3.除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

4.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警　語】：

一、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

(一)本藥每日最大建議劑量之乳糖含量超過 5g，對於牛奶或乳製品耐受度低者應小心服用或請諮詢醫師藥師藥劑生。

(二)未滿 3 個月之嬰兒不得服用。

(三)一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。

(四)制酸劑不得併用其他藥品。

二、如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。

三、消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。

四、

(一)本藥含鋁之制酸成分可能會引起便祕，偶有噁心、嘔吐。

(二)腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症（Dialysis Osteomalacia）、透析性腦病變（Dialysis encephalopathy）及低磷血症，應謹慎小心使用。

五、本藥含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。

六、本藥含碳酸鹽（或碳酸氫鹽）之制酸成分，可能引起腹脹、打嗝。

【包　　裝】：12~1000 錠塑膠瓶裝。

【貯　　存】：貯存 25℃以下，避光處。

衛署藥製字第 033878 號

正和製藥股份有限公司新營廠

台南市新營區新工路 23 號(新營工業區)