

"永昌" 紅黴素膠囊 250公絲(紅絲菌素月桂硫酸鹽)
Erythromycin Capsules 250mg "Y.C." (Erythromycin estolate)

健保代碼 A033936100 衛署藥製字第 033936 號 G-2285

永昌紅黴素膠囊，每膠囊中含有紅黴素Erythromycin base 250mg，紅黴素為Streptomyces erythraeus waksman生長的抗菌性範圍幾與青黴素(Penicillin)相等，對革蘭氏陽性細菌之效力較四環素類(Tetracycline)及鏈黴素(Streptomycin)為佳，對葡萄球菌不論是對青黴素有抗藥性或無抗藥性之菌種，均有同樣效力，對鏈黴素產生抗藥性之細菌亦有效。目前更發現其在試管中對阿米巴螺旋體顯有作用，又因其對三種型之微生物(細菌、立克次體及濾過性病毒)均有作用，故為"廣效"抗生素。

【成分】每膠囊中含有：

主成份：Erythromycin (as Estolate).....250mg(Potency)

賦形劑：Magnesium Stearate

膠囊殼：Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Purified Water、New Coccin、Titanium Dioxide、Sunset Yellow FCF、Tartrazine

【效能】葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染性。

【用法用量】成人一日4~6次，每次1~2粒。可依年齡症狀適宜增減之。本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】1. 慎重投與：患有肝機能異常或肝細胞衰竭患者使用本劑須慎重。

2. 副作用：(1)連續服用，注意肝機能異常及肝功能檢查。

(2)有過敏症狀患者須停止服用。

(3)胃腸系偶有食欲不振、噁心、嘔吐、下痢、便秘、胃痛等不適症狀。

3. 妊娠：妊娠中使用之安全性尚未確立，須依醫師囑咐，對治療上確認有益後使用。

4. 相互作用：併用下列醫藥品有增強作用，併用時須減量如：ergotamine類，carbamazepine，digoxin，theophylline，warfarin，ciclosporin等。

【配伍禁忌】1. CYP 3A 抑制劑和 Pimozide 的併用為配伍禁忌，這些藥品包括：Macrolide antibiotics(如 clarithromycin, erythromycin, dirithromycin, troleandomycin) ' Azole antifungal agents(如 ketoconazole ' fluconazole ' itraconazole) Protease inhibitors (rilonavir, saquinovir, indinavir, nelfinavir) Nefazodone Zileuton

2. 使用 Pimozide 病人亦應避免飲用葡萄柚汁，因為它所含的成分會抑制 Pimozide 的 CYP 3A 系統代謝。

【注意事項】因為 CYP 1A2 可能影響 Pimozide 的代謝，故處方上須留意，理論上潛在可能產生抑制酵素系統之藥物交互作用。

【包裝】8~1000's瓶、盒裝。

Code No: I. L. G. "Y.C."



委託者：永昌藥品股份有限公司
台中市大甲區光明路140號3樓
TEL: (04)26877114~5
FAX: (04)26872442

製造廠：利達製藥股份有限公司
台中市大甲區中山路一段906號