新型 H_2 拮抗劑

胃適服®（發模梯定）膜衣錠 20 公絲

Gasafe® (Famotidine) F.C.Tablets 20mg

衛署藥製字第 033990 號 G-2313

「成份」：每錠中含有

Famotidine 20mg

「適應症」：

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、上部消化管出血(由消化性潰瘍、急性 Stress 潰瘍、出血性胃炎而引起的)、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison 症候群。

「用法 • 用量」：

通常成人一次一錠，1 日 2 次(早餐後，晚餐後或睡覺前)經口頭與。

本藥須由醫師處方使用。

「藥理作用」：

本劑因對胃粘膜壁細胞之 H_2 接受器有拮抗作用，而產生強力且持續的胃酸分泌抑制作用，比 Cimetidine 強，持續時間也較長。

本劑口服投與後 2~3 小時達到最高血中濃度，血中半衰期約 3 小時。

口服本劑對健康正常人或消化性潰瘍患者，基礎以及投與各種刺激劑時，2 小時之胃酸及 pepsin 分泌量，各有 71.6~99.6% 及 29.5~96.9% 之抑制作用。

本劑經臨床試驗證實，對胃粘膜血流量，胃粘液分泌量、肝血流量、胃泌激素量、胃排空時間 、Prolactin、性腺刺激荷爾蒙、性荷爾蒙值等，均無影響。

本劑對中樞神經系、自律神經系、消化器官系統皆無不良影響。

本劑對胃潰瘍、十二指腸潰瘍之治療，經口服投與 6~8 星期，其治癒率達 95% ，以內視鏡判定之治癒率為 84.1~92.7%。

「副作用及臨床檢查值」：

因服用本劑而發現的副作用很低，僅占 2.5% ，主要的有便秘(1.2%)，下痢、軟便(0.4%)、發疹、皮疹(0.2%)，蕁麻疹(0.2%)。

臨床檢查值則有 S-GOT(1.3%)，S-GPT(1.9%)輕度上昇現象。

「使用上之注意事項」：

1.一般的注意

治療過程中，應充分地觀察，依其病狀，使用其治療上所必要之最小劑量，倘使用本劑，未能達到預期效果時，請更換其他之療法。

2.對下列的病人，應慎重投與

(1)以前有發生過藥物過敏症的病人

(2)患有腎不全之病人

(3)患有肝障礙之病人

3.副作用

(1)過敏症：偶爾有發疹、皮疹、蕁麻疹(紅斑)之出現，如有上述情形出現時，請即停止投與。

(2)血液：有白血球減少之傾向出現。

(3)消化系統：偶爾有便秘、下痢、軟便、口渴、噁心嘔吐；很少有腹部膨滿感、食慾不振等之症狀出現。

(4)循環系統：很少有脈搏數增加，血壓上昇、顏面潮紅，耳鳴。

(5)肝臟：偶爾會出現 S-GOT，S-GPT 上昇等之肝機能異常。

(6)精神神經系：偶爾會出現全身倦怠感、無氣力感，很少有頭重感，頭痛。

(7)其他：很少有月經不順、顏面浮腫之情形出現。

4.對妊婦、授乳婦的投與

因有關懷孕中的投與之安全性，尚未確立，故最好對妊婦或有可能懷孕之婦人，不要使用。本品會被分泌到母乳中，因此對授乳婦投與本藥時須注意避免授乳。

5.對小兒的投與

對小兒使用，其安全性尚未確立。

6.其他

本劑之投與，因有可能隱蔽胃癌之症狀，應確認

其為非惡性者再投與。

「包裝」:

10-1,000T 潔密包 10-1,000T 瓶裝