衛署藥製字第034040號
G2349

廣效性抗黴菌劑附加類固醇

舒舒乳膏
S. S. Cream

【主成分】：Each gm contains：
Diflucortolone 21-Valerate.....1mg
Isoconazole Nitrate.....10mg
【賦形劑】：Carboxypolymethylene 940、Glycerin (eq to Glycerol)、Hydroxyethylcellulose、Silicon dioxide, precipitated、Propylene Glycol、Methyl Paraben、Poloxamer 407、Solution、Triethanolamine、EDTA-2Na、Rose water、Purified Water
【特　質】：Isoconazole Nitrate用於治療局部黴菌皮膚疾病，具有非常廣效的抗黴菌效用，有效地對抗皮癬菌、酵母菌、似酵母菌黴菌和絲菌，而且對於斑色糠疹 (蛇皮癬) 和寄生性紅癬亦有著效。
Diflucortolone 21-Valerate抑制發炎和過敏性皮膚障害以及減輕主訴症狀如搔癢、燒灼。
【適應症】：香港腳、頑癬、腹股溝黴菌感染、皮膚搔癢症、指(趾)間區，手部之黴菌感染症。
【用法用量】：一般每天使用兩次，塗敷於皮膚患處(包括指(趾)間區)，通常推薦放置一塊塗上舒舒乳膏的紗布於指(趾)間區，待發炎或溼疹性皮膚症狀消退後，即應停止使用，而改以不含類固醇的脫癬軟膏繼續治療 (特別是於治療腹股溝和生殖器區之病症時)，由於加了Diflucortolone 21-Valerate，用在有重度發炎或溼疹皮膚情況的黴菌感染開始或中期治療。
本藥須由醫師處方使用。
本品不適用於治療口週圍皮膚炎及酒渣鼻。

【副　作　用】：
1. 使用範圍大(約佔身體之10%或超過10%)和/或長期使用(超過4星期)可能發生以下反應：局部伴隨之徵狀如皮膚萎縮、毛細管擴張、紋路和皮膚產生痤瘡以及因吸收類固醇而產生的全身作用。
2. 母親在懷孕或哺乳時曾經做治療 (大量或長期)則新生兒不能避免其副作用 (例如懷孕最後幾週，使用會使腎上腺皮質功能被減損)。
3. 一般來說含有腎上腺類固醇局部用藥在懷孕的前三個月不得使用，特別要避免用在身體的大面積或長期使用。

【禁忌和危險】：
於需治療之區域上患有結核及梅毒、濾過性病毒疾病(如牛痘、天花、水痘)，懷孕初期的三個月內禁用所有含有類固醇的製劑作大量和長期之局部治療。

【包裝】：100公克以下管裝。
【儲存條件】：25℃以下。

適用藥害救濟制度

委託者：合成藥品股份有限公司
高雄市新興區洛陽街11號5F之6
製造廠：美西製藥有限公司
PIC/S GMP 高雄市仁武區仁武里工業一路 9 號